

Daugiasluoksnio konstrukcinio elemento optimizavimas tampriai plastinėje zonoje

Vytautas KLEIZA (MII), Jonas BAREIŠIS (KTU)

e-mail: vytautas.kleiza@ktl.mii.lt, tfdek@midi.ppf.ktu.lt

Daugiasluoksnį strypų (DS) tampriai plastinio deformavimo efektyvumui ivertinti darbe [1] ivesta *efektingumo koeficiente* $m(\alpha, \beta, \gamma)$ sąvoka, naudojant ribinių išražų santykį, t.y. minimalios apkrovos, sukeliančios plastines deformacijas visame DS skerspjūvyje ir maksimalios apkrovos sukeliančios tampriasių deformacijas visame DS skerspjūvyje santykį. Naudojant komutuojančią matricų metodą [2], darbe [3] irodyta, kad

$$m(\alpha, \beta, \gamma) = (\alpha\gamma + 1)(\alpha\beta + 1)^{-1} \max\{\beta\gamma^{-1}, 1\}.$$

Šiame darbe tiriamas skalarinis laukas $m(\alpha, \beta, \gamma)$, apibrėžtas uždaroje ir iškiloje srityje $\bar{D} = \{\alpha_0 \leq \alpha \leq \alpha_1, \beta_0 \leq \beta \leq \beta_1, \gamma_0 \leq \gamma \leq \gamma_1\}$, čia $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1, \gamma_0, \gamma_1 > 0$ ir $\alpha_0 < \alpha_1, \beta_0 < \beta_1, \gamma_0 < \gamma_1$, t.y. nustatomos globaliojo ir lokaliųjų ekstremumų egzistavimas, lokalizavimas bei jų vertės. Funkcija $m(\alpha, \beta, \gamma)$ tolydi srityje \bar{D} ir todėl aprėžta. Jei plokštuma $P = \{\alpha_0 \leq \alpha \leq \alpha_1, \beta = \gamma\}$ turi bendrų taškų su sritimi \bar{D} , tai pastaroji dalina sritį į dvi dalis

$$\bar{D}_1 = \left\{ \begin{array}{l} \alpha_0 \leq \alpha \leq \alpha_1 \\ \gamma_0 \leq \beta \leq \gamma \leq \gamma_1 \end{array} \right\} \neq \emptyset, \quad \bar{D}_2 = \left\{ \begin{array}{l} \alpha_0 \leq \alpha \leq \alpha_1 \\ \gamma_0 \leq \gamma \leq \beta \leq \beta_1 \end{array} \right\} \neq \emptyset,$$

ir

$$\bar{D} = \bar{D}_1 \cup \bar{D}_2, \quad \bar{D}_1 \cap \bar{D}_2 = P,$$

arba eina per vieną srities briaunų: $B_{10} = \{\alpha_0 \leq \alpha \leq \alpha_1, \beta = \beta_1, \gamma = \gamma_0\}$ arba $B_{01} = \{\alpha_0 \leq \alpha \leq \alpha_1, \beta = \beta_0, \gamma = \gamma_1\}$. Jei plokštuma P neturi bendrų taškų su sritimi \bar{D} , tai arba $\bar{D} = \bar{D}_1$ arba $\bar{D} = \bar{D}_2$. \bar{D} viršūnes (kraštinių iškilos srities taškai) atitinkamai žymėsime $v_{ijk} = (\alpha_i, \beta_j, \gamma_k)$, $i, j, k = 0, 1$, (pvz. $v_{010} = (\alpha_0, \beta_1, \gamma_0)$), o bet kuri erdvės R_3^+ tašką $(\alpha, \beta, \gamma) = v$. Visus uždaros srities \bar{D} poaibius, kuriuose pasiekiami funkcijos $m(v)$ globalieji ekstremumai žymime $\text{Arg} \max_{\bar{D}} m(v)$ ir $\text{Arg} \min_{\bar{D}} m(v)$.

1 teiginys. Jei plokštuma P turi bendrų taškų su sritimi \bar{D} , tada funkcijos $m(v)$ globalusis minimums pasiekiamas tik sankirtoje $\bar{D} \cap P$, be to

$$\text{Arg} \min_{\bar{D}} m(v) = \text{Arg} \min_{\bar{D}_1} m(v) = \text{Arg} \min_{\bar{D}_2} m(v) = \bar{D} \cap P,$$

o, jei $v \in \bar{D} \cap P$, tai $m(v) \equiv \min_{v \in \bar{D}} m(v) = 1$.

Irodymas. Iš $v \in \overline{D} \cap P \neq \emptyset$, turime $\beta = \gamma$ ir $m(v) \equiv 1$. Atviroje srityje $\overline{D}_1 \setminus P$ skirtumas $(\gamma - \beta) > 0$, todėl funkcija

$$m(v) - 1 = (\alpha\gamma + 1)(\alpha\beta + 1)^{-1} - 1 = \alpha(\gamma - \beta)(\alpha\beta + 1)^{-1} > 0,$$

o atviroje srityje $\overline{D}_2 \setminus P$ skirtumas $(\gamma - \beta) < 0$, todėl

$$m(v) - 1 = (\alpha\gamma + 1)(\alpha\beta + 1)^{-1}\beta\gamma^{-1} - 1 = (\beta - \gamma)(\alpha\beta\gamma + \gamma)^{-1} > 0.$$

Iš įrodyto sekā, kad tik taškuose $v \in \overline{D} \cap P$ pasiekiamas funkcijos $m(v)$ globalusis minimums, be to $\min_{\overline{D}_1} m(v) = \min_{\overline{D}_2} m(v) = 1$.

2 teiginys. Funkcijos $m(v)$ globalusis maksimumas pasiekiamas uždaro stačiakampio gretasienio \overline{D} vienoje arba keliuose viršūnėse v_{ijk} neesančiose plokštumoje $\overline{D} \cap P$.

Irodymas. Parodysime, kad funkcijos $m(v)$ gradientas atviroje srityje $D \setminus P$, ant ją ribojančių plokštumų ir jos briaunų, nepriklausomai nuo jos padėties plokštumos atžvilgiu, nelygus nuliui. Srityje D_1

$$m(v) = (\alpha\gamma + 1)(\alpha\beta + 1)^{-1}, m(v) \in C^1[D_1],$$

$$\text{grad}(m(v)) = (\alpha\beta + 1)^{-2} [(\gamma - \beta)\mathbf{i} - \alpha(\alpha\gamma + 1)\mathbf{j} + \alpha(\alpha\beta + 1)\kappa],$$

o srityje D_2

$$m(v) = (\alpha\beta\gamma + \beta)(\alpha\beta\gamma + \gamma), m(v) \in C^1[D_2],$$

$$\text{grad}(m(v)) = (\alpha\beta + 1)^{-2}\gamma^{-2} [\beta\gamma(\gamma - \beta)\mathbf{i} + \gamma(\alpha\gamma + 1)\mathbf{j} - \beta(\alpha\beta + 1)\kappa].$$

Kad (11) ir (12) virstų nuliu srityje D būtina ir pakankama, kad

$$\mathbf{V}(v) = [(\gamma - \beta)\mathbf{i} + (\alpha\gamma + 1)\mathbf{j} + (\alpha\beta + 1)\kappa] = 0,$$

bet tai neįmanoma, nes $|(\gamma - \beta)| > 0$, $(\alpha\gamma + 1) > 0$, $(\alpha\beta + 1) > 0$. Samprotaujant analogiškai turime, kad sriti D ribojančiose plokštumose ir jos briaunose (kaip atvirose aibėse) $\text{grad}_2(m(v)) \neq 0$ ir $\text{grad}_1(m(v)) \neq 0$. Iš įrodyto ir būtinos ekstremumo egzistavimo sąlygos ir iš *1 teiginio*, sekā *2 teiginys*.

Nustatėme, kad funkcijos $m(v)$ globalusis maksimumas pasiekiamas tik srities \overline{D} viršūnėse neesančiose plokštumoje P . Jei sritis \overline{D} neturi bendrų taškų su plokštuma P , gautą rezultatą galima patikslinti.

3 teiginys.

$$\text{Arg} \min_{\overline{D}} m(v) = \begin{cases} v_{010}, & \text{jei } \overline{D}_2 = \emptyset \\ v_{101}, & \text{jei } \overline{D}_1 \neq \emptyset \end{cases}, \quad \text{Arg} \max_{\overline{D}} m(v) = \begin{cases} v_{101}, & \text{jei } \overline{D}_2 \neq \emptyset \\ v_{010}, & \text{jei } \overline{D}_1 = \emptyset \end{cases}.$$

Irodymas. Jei $D_1 \neq \emptyset$ ir $D_2 = \emptyset$ tai plokštumoje $A_0 = \{\alpha = \alpha_0, \beta_0 \leq \beta \leq \beta_1, \gamma_0 \leq \gamma \leq \gamma_1\}$, kurioje yra keturios srities \overline{D} viršūnės

$$m(\alpha_0, \beta, \gamma) - m(v_{010}) = \frac{\alpha_0\gamma + 1}{\alpha_0\beta + 1} - \frac{\alpha_0\gamma_0 + 1}{\alpha_0\beta_1 + 1} \geq 0,$$

nes $\alpha_0\gamma \geq \alpha_0\gamma_0$, $\alpha_0\beta \leq \alpha_0\beta_1$, o lygybė $m(\alpha_0, \beta, \gamma) - m(v_{010}) = 0$ galioja tik kai $\beta = \beta_1$, $\gamma = \gamma_0$. Plokštumoje $A_1 = \{\alpha = \alpha_1, \beta_0 \leq \beta \leq \beta_1, \gamma_0 \leq \gamma \leq \gamma_1\}$, kurioje yra likusios keturios srities \bar{D} viršūnės

$$m(\alpha_1, \beta, \gamma) - m(v_{110}) = \frac{\alpha_1\gamma + 1}{\alpha_1\beta + 1} - \frac{\alpha_1\gamma_0 + 1}{\alpha_1\beta_1 + 1} \geq 0,$$

nes $\alpha_1\gamma \geq \alpha_1\gamma_0$, $\alpha_1\beta \leq \alpha_1\beta_1$, o lygybė $m(\alpha_1, \beta, \gamma) - m(v_{110}) = 0$ galioja tik kai $\beta = \beta_1$, $\gamma = \gamma_0$.

Pagal 2 teiginių globalusis minimums gali būti pasiekta tik srities \bar{D} viršūnėse v_{ijk} , t.y. viršūnėse v_{010} arba v_{110} . Tačiau, iš $D_1 \neq \emptyset$ ir $D_2 = \emptyset$ sekā, kad $(\gamma - \beta) > 0$ ir $\frac{\partial m}{\partial \alpha} = (\gamma - \beta)(\alpha\beta + 1)^{-2} > 0$, todėl $m(v_{010}) < m(v_{110})$ ir $\operatorname{Arg min}_{\bar{D}} m(v) = v_{010}$. Analogiškai įrodoma, kad $\operatorname{Arg max}_{\bar{D}} m(v) = v_{101}$.

Jei $D_1 = \emptyset$ ir $D_2 \neq \emptyset$, tai plokštumose A_0 ir $A_1 \frac{\partial m}{\partial \beta} > 0$, $\frac{\partial m}{\partial \gamma} < 0$, todėl (pasinaudojė tuo kad globalieji minimums ir maksimumas gali būti pasiekti tik srities \bar{D} viršūnėse) turime

$$\operatorname{Arg min}_{\bar{D}} m(\alpha_0, \beta, \gamma) = (\alpha_0, \min_{\bar{D}} \beta, \max_{\bar{D}} \gamma) = (\alpha_0, \beta_0, \gamma_1) = v_{001},$$

$$\operatorname{Arg min}_{\bar{D}} m(\alpha_1, \beta, \gamma) = (\alpha_1, \min_{\bar{D}} \beta, \max_{\bar{D}} \gamma) = (\alpha_1, \beta_0, \gamma_1) = v_{101}.$$

Tačiau, kai $D_1 = \emptyset$ ir $D_2 \neq \emptyset$ vertė $(\gamma - \beta) < 0$ ir $\frac{\partial m}{\partial \alpha} = \beta\gamma(\gamma - \beta)(\alpha\beta + 1)^{-2}\gamma^{-2} < 0$, todėl $m(v_{001}) > m(v_{101})$ ir $\operatorname{Arg min}_{\bar{D}} m(v) = v_{101}$. Analogiškai įrodoma, kad $\operatorname{Arg max}_{\bar{D}} m(\alpha, \beta, \gamma) = v_{010}$.

4 teiginys. Jei $D_1 \neq \emptyset$ ir $D_2 \neq \emptyset$ tai funkcijos $m(v)$ globalusis maksimumas pasiekiamas viršūnėje v_{010} , arba/ir viršūnėje v_{101} .


$$\operatorname{Arg max}_{\bar{D}} m(v) = v_{010} \cup v_{101}, \quad \text{jei } \bar{D} \cap P \neq \emptyset,$$

$$\max_{\bar{D}} m(v) = \max \{m(v_{010}), m(v_{101})\}, \quad \text{jei } \bar{D} \cap P \neq \emptyset.$$

Įrodymas. Srityje $D_1 \neq \emptyset$ remiantis 2 teiginiu $m(v)$ maksimumas pasiekiamas tik \bar{D}_1 viršūnėse neesančiose plokštumoje P , o, taikant 2 teiginio įrodymo metodą gauname, kad pastarasis pasiekiamas tik viršūnėje v_{101} . Samprotaudami analogiškai, turime, kad, srityje \bar{D}_2 $m(v)$ maksimumas pasiekiamas tik viršūnėje v_{010} , todėl srityje \bar{D} globalusis maksimumas pasiekiamas viršūnėje v_{010} , arba viršūnėje v_{101} . Dėl funkcijos $m(v)$ tolydumo srityje \bar{D} egzistuoja tokia srities \bar{D} ir plokštumos P tarpusavio padėtis, kad $\max_{\bar{D}} m(v) = \max_{\bar{D}_1} \{m(v)\} = \max_{\bar{D}_2} \{m(v)\}$, todėl globalusis maksimumas pasiekiamas viršūnėje v_{010} , arba/ir viršūnėje v_{101} .

Įrodytų teiginių iliustracijai 1 pav. pateiktos funkcijos $m(v)$ verčių lygio linijos ($m(v) = C$, $C \geq 1$) pjūvyje $\alpha = \alpha_* = \text{const}$, kurių analizinės išraiškos, jei $\beta \leq \gamma$

$$\gamma = C\beta + \frac{(C-1)}{\alpha_*},$$



I pav. Funkcijos $m(\alpha, \beta, \gamma)$ lygio linijos $m(\alpha, \beta, \gamma) = C$ pjūvyje, kai $\alpha = 0.35$ ir $C = 1, 00; 1, 25; 1, 50; 1, 75; 2, 00$.

tai tiesių (su krypties koeficientu didesniu už vieną) pluoštas su bendru tašku, nepriklausančiu nuo C vertės, kurio koordinatės $\beta_* = -\alpha^{-1}$, $\gamma_* = -\alpha^{-1}$.

Jei $\beta > \gamma$

$$\gamma = -\frac{L^2(\alpha_*, C)}{C[\beta + L(\alpha_*, C)]} + \frac{L(\alpha_*, C)}{C}, \quad L(\alpha_*, C) = \frac{C}{\alpha_*(C-1)},$$

tai hiperbolės turinčios horizontalias asymptotes $\gamma = L(\alpha_*, C)C^{-1}$ ir du bendrus taškus, nepriklausančius nuo C vertės, kurių koordinatės $\beta_* = -\alpha_*^{-1}$, $\gamma_* = -\alpha_*^{-1}$ ir $\beta_{**} = 0$, $\gamma_{**} = 0$. Suprantama, kad kiekvienoje plokštumoje $\alpha = \alpha_*$ kiekvienu lygio linija kerta tieses $\gamma = \text{const}$ arba $\beta = \text{const}$ tik vieną kartą.

Remiantis įrodytais teiginiais galima nurodyti paprastas globaliųjų ekstremumų skaičiavimo algoritmus:

1. Jei $\beta_1 < \gamma_0$, tai

$$\min_{\bar{D}} m(v) = \frac{\alpha_0 \gamma_0 + 1}{\alpha_0 \beta_1 + 1}, \quad \max_{\bar{D}} m(v) = \frac{\alpha_1 \gamma_1 + 1}{\alpha_1 \beta_0 + 1}.$$

2. Jei $\beta_0 > \gamma_1$, tai

$$\min_{\bar{D}} m(v) = \frac{\alpha_1 \beta_0 \gamma_1 + \beta_0}{\alpha_1 \beta_0 \gamma_1 + \gamma_1}, \quad \max_{\bar{D}} m(v) = \frac{\alpha_0 \beta_1 \gamma_0 + \beta_1}{\alpha_0 \beta_1 \gamma_0 + \gamma_0}.$$

3. Jei $\beta_0 > \gamma_1$ ir $\beta_1 > \gamma_0$, tai

$$\min_{\bar{D}} m(v) = 1, \quad \max_{\bar{D}} m(v) = \max \left\{ \frac{\alpha_1 \gamma_1 + 1}{\alpha_1 \beta_0 + 1}, \frac{\alpha_1 \beta_0 \gamma_1 + \beta_0}{\alpha_1 \beta_0 \gamma_1 + \gamma_1} \right\}.$$

Literatūra

1. J. Bareišis, V. Kleiza, Investigation of limiting loads of stretched (compressed) multilayer rods under plastic strain, *Mechanika*, ISSN 1392-1207, **2**(40), 5–11 (2003).
2. V. Kleiza, Tamprai plastinio uždavinio sprendimas komutuojančių matricų erdvėje, *Liet. matem. rink.*, ISSN 0132-2818, **41**(spec. nr.), 511–516 (2001).
3. J. Bareišis, V. Kleiza, Research in the limiting efficiency of plastic deformation of multilayer tension (compression) bars, *Mechanics of Composite Materials*, ISSN 0191-5665, Plenum Publishing Corporation, **40**(2), 135–144 (2004).

SUMMARY

V. Kleiza, J. Bareišis. The optimization of a multilayer structural element in plasto-elastic zone

To estimate the efficiency of plasto-elastic strain multilayer rods, a concept of the efficiency coefficient has been introduced. In this paper, it has been proved that, if the efficiency coefficient, as a function of three variables is defined in a rectangular parallelepiped, then both the global minimum and the maximum are in the vertices of this domain.

Keywords: multilayer rod, limiting load, elasticity, plasticity, optimization, nonlinear programing.