

Apie pirmos eilės diferencialinių lygčių neaprėžtus sprendinius

Gintautas GUDYNAS (KU)

el. paštas: ggintaut@gmf.ku.lt

Diferencialinių lygčių teorijoje apibrėžiant pradinių arba kraštinių uždavinių sprendinius t.t. formulėmis plačiai yra naudojami taip vadinami fundamentalūs arba ypatingi sprendiniai. Straipsnyje [1] Koši uždavinio

$$\begin{aligned} u_t + F(t, x, u, u_x) &= 0, \\ u(0, x) &= \varphi(x), \end{aligned} \tag{1}$$

sprendiniai buvo užduoti formule

$$u(t, x) = \inf_{\xi \in R^n} [\varphi(\xi) + \Phi(t, x, \xi)].$$

Funkciją $\Phi(t, x, \xi)$ galime apibrėžti taip: tegul $u^c(t, x, \xi)$ yra (1) lygties sprendiniai, tenkinantys pradinę sąlygą

$$u(0, x) = c|x - \xi|,$$

tuomet

$$\Phi(t, x, \xi) = \lim_{c \rightarrow +\infty} u^c(t, x, \xi).$$

Pastebėsime, kad ši funkcija tenkina tokią pradinę sąlygą

$$\Phi(0, x, \xi) = \begin{cases} 0, & x = \xi, \\ +\infty, & x \neq \xi. \end{cases}$$

Šiame darbe panašus algoritmas naudojamas apibrėžiant diferencialinės lygties

$$y' + H(x, y) = 0, \tag{2}$$

bendrajį sprendinį. Pradžioje yra apibrėžiami sprendiniai $G(x, \xi)$ tenkinantys pradinę sąlygą.

$$G(\xi, \xi) = +\infty. \tag{3}$$

Juos galime užduoti tokiu būdu: tegul $y^c(x, \xi)$ (2) lygties sprendinys su pradine sąlyga

$$y(\xi) = c,$$

tuomet

$$G(x, \xi) = \lim_{c \rightarrow +\infty} y^c(x, \xi).$$

Straipsnyje suformuluotos sąlygos, kuomet funkcija $G(x, \xi)$ yra baigtinė ir užduoda bendrajį (2) lygties sprendinį.

Tokio tipo konstrukcijos netinka tiesinėms lygtims. Pavyzdžiui, nagrinėjant tiesinę (2) lygtį galime parodyti, kad $G(x, \xi) = +\infty$, kai $(x, \xi) \in R^2$.

Tegul funkcijos $H(x, y)$, $H_y(x, y)$ yra tolydžios erdvėje R^2 . Tarkime egzistuoja tokie $y_0 \in R$, kad

$$H(x, y) \succ 0, \quad (4)$$

o integralas

$$\int_{y_0}^{+\infty} \frac{dy}{H(x, y)}, \quad (5)$$

tolygiai konverguoja $+\infty$ aplinkoje, kai $y \geq y_0$, o x priklauso aprėžtoms aibėms iš R . Prie šių sąlygų yra teisinga teorema.

Teorema. *Funkcija $G(x, \xi)$ yra (2) lygties vienintelis sprendinys, tenkinantis pradine sąlygą (3). Jeigu funkcija $H(x, y)$ tenkina sąlygą*

$$H(x, y) \geq \alpha_1 |y|^{1+\alpha} + \alpha_2, \quad (6)$$

$\alpha_1, \alpha_2 \succ 0$, visiems $(x, y) \in R^2$, tuomet funkcija $G(x, \xi)$ yra (2) lygties bendrasis sprendinys.

Irodymas. Fiksujome $\xi \in R$. Remiantis egzistavimo ir vienaties teorema, sprendiniai y^c egzistuoja ir $y^{c_1} \succ y^{c_2}$, kai $c_1 \succ c_2$. Parodysime, kad jie yra tolygiai pagal c aprėžti intervale $(\xi, \xi + \varepsilon]$. Skaičių $\varepsilon \succ 0$ parinksime tokį, kad šiame intervale $y^{c_0}(x, \xi) \geq y_0$ kokiam nors c_0 . Toksai skaičius c_0 egzistuoja, nes $y^{c_0}(\xi, \xi) = c_0$, taigi galime jį paimti pakankamai didelį ir toliau pasinaudoti funkcijos $y^{c_0}(x, \xi)$ tolydumu. Tegul $c \geq c_0$ ir $x \in (\xi, \xi + \varepsilon]$. Remiantis (2), (4)

$$\frac{y^{c'}(x, \xi)}{H(x, y^c(x, \xi))} + 1 = 0$$

arba

$$\int_{\xi}^x \frac{y^c(t, \xi)}{H(t, y^c(t, \xi))} dt + x - \xi = 0.$$

Atlikę pakeitimą $s = y^c(t, \xi)$, $t = (y^c)^{-1}(s)$ po integralo ženklu (iš lygties (2) ir sąlygos (4) turėsime funkcijos $y^c(t, \xi)$ monotoniškumą intervale $(\xi, \xi + \varepsilon]$), gausime

$$\int_c^{y^c(x, \xi)} \frac{ds}{H((y^c)^{-1}(s), s)} + x - \xi = 0,$$

arba

$$\int_{y^c(x, \xi)}^c \frac{ds}{H((y^c)^{-1}(s), s)} = x - \xi > 0. \quad (7)$$

Fiksuoisme $x \in (\xi, \xi + \varepsilon]$. Tegul $x - \xi = \varepsilon_0$. Kadangi $(y^c)^{-1}(s) \in [\xi, x]$, kai $s \in [y^c(x, \xi), c]$, tai remiantis (5) galime teigti, jog egzistuoja $C \geq y_0$, kad

$$\left| \int_{y^c(x, \xi)}^c \frac{ds}{H((y^c)^{-1}(s), s)} \right| < \varepsilon_0,$$

kai $y^c(x, \xi)$, $c \geq C$. Pasinaudoję (7) gauname, kad $y^c(x, \xi) < C$, kai $c \geq C$.

Taigi ribinė funkcija $G(x, \xi)$ intervale $(\xi, \xi + \varepsilon]$ yra baigtinė ir monotonai mažėjanti. Parodysime, kad ši funkcija tenkina (2) lygtį. Tegul $x_0, x_0 + h \in (\xi, \xi + \varepsilon]$. Pasinaudodami funkcijos $H(x, y)$ tolydumu ir (2) lygtimi, o taip pat funkcijų $y^c(x, \xi)$ aprėžtumu, kai $x \in [\xi + \delta, \xi + \varepsilon]$, gausime, kad egzistuoja konstanta $M > 0$, nepriklausanti nuo c , tokia, kad

$$|y^c(x_0 + h, \xi) - y^c(x_0, \xi)| = \int_{x_0}^{x_0+h} H(x, y^c(x, \xi)) dx \leq Mh.$$

Perėjus prie ribos, kai $c \rightarrow +\infty$, gauname funkcijos $G(x, \xi)$ tolydumą pagal x . Toliau, pasinaudoję Dini teorema, galime teigti, kad monotonai didėjanti funkcijų sekai $\{y^c(x, \xi)\}$ tolygiai intervale $[\xi + \delta, \xi + \varepsilon]$ konverguoja prie funkcijos $G(x, \xi)$, kai $c \rightarrow +\infty$. Taigi galime pereiti prie ribos, kai kai $c \rightarrow +\infty$, lygybėje

$$y^c(x, \xi) - y^c(x_0, \xi) = - \int_{x_0}^x H(x, y^c(x, \xi)) dx$$

po integralo ženklu, kai $x_0, x \in [\xi + \delta, \xi + \varepsilon]$, bet kokiam $\delta \in (0, \varepsilon)$. Gausime

$$G(x, \xi) - G(x_0, \xi) = - \int_{x_0}^x H(x, G(x, \xi)) dx.$$

Taigi funkcija $G(x, \xi)$ tenkina (2) lygti, o remiantis funkcijos $G(x, \xi)$ apibrėžimu gausime sąlygą (3).

Parodysime, kad taip apibrėžta funkcija $G(x, \xi)$ yra vienintelė. Tarkime $G^*(x, \xi)$ yra kitas (2), (3) uždavinio sprendinys. Fiksuokime intervalą $(\xi, \xi + \varepsilon)$, kuriame abu sprendiniai yra apibrėžti ir paimkime $x_0 \in (\xi, \xi + \varepsilon)$. Iš egzistavimo ir vienaties teoremos seka, kad $G^*(x_0, \xi) \succ y^c(x_0, \xi)$ bet kokiam $c \in R$, vadinas $G^*(x_0, \xi) \succ G(x_0, \xi)$. Kad įrodytume priešingą nelygybę, paimkime $G^*(x + \delta, \xi)$, $\delta \succ 0$, $x + \delta \in (\xi, \xi + \varepsilon)$. Akivaizdu, kad $y^c(x, \xi) \succ G^*(x + \delta, \xi)$, kai $c \succ G^*(\xi + \delta, \xi)$, taigi ir $G(x_0, \xi) \succ G^*(x_0 + \delta, \xi)$. Pasinaudoję funkcijos $G(x, \xi)$ tolydumu pagal x ir perėję prie ribos, kai $\delta \rightarrow 0$, gauname $G(x_0, \xi) \succ G^*(x_0, \xi)$ arba $G(x_0, \xi) = G^*(x_0, \xi)$.

Dabar įrodysime, kad funkcija $G(x, \xi)$ yra (2) lyties bendrasis sprendinys. Remiantis (6)

$$0 = G_x(x, \xi) + H(x, G(x, \xi)) \geq G_x(x, \xi) + \alpha_1 |G(x, \xi)|^{1+\alpha} + \alpha_2,$$

arba

$$G_x(x, \xi) + \alpha_1 |G(x, \xi)|^{1+\alpha} + \alpha_2 \leq 0.$$

Atlikę elementarius pertvarkymus turėsime

$$\begin{aligned} & \int_{\xi+\delta}^x \frac{G_x(x, \xi) dx}{\alpha_1 |G(x, \xi)|^{1+\alpha} + \alpha_2} + x - \xi - \delta \leq 0, \\ & \int_{G(\xi+\delta, \xi)}^{G(x, \xi)} \frac{dG}{\alpha_1 |G|^{1+\alpha} + \alpha_2} + x - \xi - \delta \leq 0, \end{aligned}$$

kai $\xi + \delta, x$ priklauso funkcijos $G(x, \xi)$ apibrėžimo sričiai ir $\xi + \delta \prec x$, $\delta \succ 0$. Iš pastarosios nelygybės turėsime, kad funkcija $G(x, \xi)$ yra pratesiama tiktais baigtiniame intervale (ξ, x^*) , t.y. $\lim_{x \rightarrow x^*-0} G(x, \xi) = -\infty$ ir $x^* \prec +\infty$.

Tegul $y(x)$ yra (2) lyties sprendinys, tenkinantis pradinę sąlygą $y(x_0) = y_0$. Parodysime, kad egzistuoja tokis $\xi_0 \in R$, kuriam $y(x) = G(x, \xi_0)$. Galimi du atvejai: arba sprendinys $y(x)$ pratesiamas iš kairė nuo taško x_0 tiktais baigtiniame intervale (x_*, x_0) , $x_* \succ -\infty$, arba tas intervalas yra begalinis. Pirmuoju atveju iš (6) turėsime $\lim_{x \rightarrow x_*+0} y(x) = +\infty$, o tai reiškia, jeigu pasinaudosime sprendinio $G(x, \xi)$ vienatimi, kad $y(x) = G(x, x_*)$. Antruoj atveju sprendinys $y(x)$ turi turėti bendrą tašką su

kokiu nors sprendiniu $G(x, \xi)$, t.y. jis turi sutapti su juo. Tai prieštarauja įrodytai sprendinių $G(x, \xi)$ savybei, kad jie yra pratesiami tiktais baigtiniame intervale.

Teorema įrodyta.

Pavyzdys. Teorema gali būti pritaikyta Rikati lygčiai

$$y' + a(x)y^2 + b(x)y + c(x) = 0.$$

Jeigu funkcijos $a(x), b(x), c(x)$ yra tolydžios funkcijos ir $a(x) \geq a_0 > 0$, tai bet kokiam $\xi \in R$ egzistuoja šios lyties sprendinys, tenkinantis pradinę sąlygą (3). Lygčiai

$$y' + y^2 - 1 = 0 \quad (8)$$

nėra išpildyta (6) sąlyga. Šiuo atveju, kaip nesunku matyti, funkcijų šeima

$$G(x, \xi) = \frac{1 + e^{-2(x-\xi)}}{1 - e^{-2(x-\xi)}}$$

nėra (8) lyties bendrasis sprendinys, nes ją sudarančių funkcijų grafikai negali kirsti pusiausvyros taško $y \equiv 1$, o tai reiškia, kad jie negali eiti per taškus (x_0, y_0) , kuriems $y_0 \leq 1$.

Literatūra

- [1] G. Gudynas, Generalized solutions of non-linear equations of first order with the bounded and lower semi-continuous initial function, *Preprint*, Vilnius (in Russian) (1990).

On unbounded solutions of the first order ordinary differential equations

G. Gudynas

The article is concerned with Cauchy problem

$$\begin{aligned} G_x(x, \xi) + H(x, G(x, \xi)) &= 0, \\ G(\xi, \xi) &= +\infty. \end{aligned}$$

Let $H(x, y), H_y(x, y) \in C(R^2)$ and

$$H(x, y) > \alpha_1 |y|^{1+\alpha} + \alpha_2,$$

where $\alpha_1, \alpha_2 > 0$. Then there exists the unique solution $G(x, \xi)$ of Cauchy problem and it is general solution of this equation.