

Fizinio aktyvumo, medikamentinio gydymo, maisto papildų ir kognityvinių treniruočių įtaka Alzheimerio ligos, susijusių demencijų prevencijai ir kognityvinių gebėjimų išlaikymui

G. Navickaitė

Vilniaus universitetas,
Medicinos fakultetas

Santrauka. Dėl senėjančios visuomenės, Alzheimerio liga ir susijusios demencijos tampa vis rimtesnes problema. Iki šiol nėra atrastų nei efektyvių gydymo metodų, nei veiksnių, galinčiu sumazinti tikimybę susirgti šiomis ligomis. Viešai diskutuojama apie galimą fizinio aktyvumo, vaistų, maisto papildų ar kognityvinių treniruočių naudą kognityviniam žmogaus gebėjimams. Tačiau šių metodų nauda nėra įrodyta susijusiais tyrimais. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti šių keturių sričių atliktu sisteminių analizų rezultatus, vertinant minėtų metodų efektą Alzheimerio ligos, susijusių demencijų ir lengvo kognityvinio sutrikimo prevencijai.

Raktažodžiai: Alzheimerio liga, demencija, lengvas kognityvinis sutrikimas, fizinis aktyvumas, medikamentinis gydymas, maisto papildai, kognityvinės treniruotės.

ĮVADAS

Daugiau nei 40 milijonų žmonių visame pasaulyje serga Alzheimerio liga (AL) ar kitomis demencijų formomis [1]. AL ir susijusios demencijos (angl. *Alzheimer disease and related dementias*, ADRD) itin pablogina sergančiųjų gyvenimo kokybę ir sukuria papildomą naštą bei rūpesčius sergančiojo artimiesiems. Dažnai asmenys, sergantys demencija, yra paliekami specifinių slaugos institucijų priežiūrai. JAV demenciją turinčių asmenų priežiūros išlaidos viršija širdies ligų ar vėžio gydymo išlaidas, kurias dažniausiai patiria jų artimieji [2]. Dabartinėmis prognozėmis, iki 2050 m. žmonių, turinčių demenciją ar sergančių AL, gali patrigubėti [3]. Dažniausia demencijos priežastis – Alzheimerio liga, tačiau diferencijuoti, ar demenciją sukelė vien tik AL, ar prisdėjo ir kiti demenciją sukeliantys faktoriai, beveik neįmanoma. Dažnai prieš išsvystant demencijai, pacientai turi išgiję lengvą kognityvinį sutrikimą

(angl. *mild cognitive impairment*, MCI) [4]. Taigi, ieškoti efektyvių prevencijos priemonių nuo AL ir kitų demencijų rūsių yra vienas pagrindinių tikslų, norint užkirsti masišką šių susirgimų plėtimą ateityje.

Yra kelios pagrindinės sritys, į kurias dedamos didelės viltys, siekiant užkirsti kelią AL ir kitoms demencijoms – tai fizinis aktyvumas, medikamentinis gydymas, maisto papildai ir kognityvinės treniruotės.

FIZINIS AKTYVUMAS

Daugelis tiki, kad fizinis aktyvumas mažina demencijos ir kognityvinių gebėjimų blogėjimo tikimybę. Vis dėlto, ryšys tarp fizinio aktyvumo ir demencijos prevencijos nėra tiesioginis – fizinis aktyvumas mažina nutukimo, diabeto ar hipertenzijos galimybę, o šie veiksniai turi tiesioginę įtaką ADRD.

Brasure ir kolegų atlikta sisteminė fizinio aktyvumo ir ADRD prevencijos klinikinių tyrimų analizė nagrinėja 16 klinikinių tyrimų, atliktu 2009–2017 m. [5]. Remiantis nagrinėjamais tyrimais, sisteminėje analizėje išskiriamais dvi galimos fizinio aktyvumo grupės: fizinis aktyvumas,

Adresas:
Gintarė Navickaitė
Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas,
M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
El. paštas navickaitegintare@yahoo.com

neįtraukiant papildomų veiksnių, ir fizinio aktyvumo nauja kartu su kitaais veiksniiais. Fizinis aktyvumas skirstomas į daugiakomponentį fizinį aktyvumą, aerobinį aktyvumą, jégos pasipriešinimo treniruotes ir tai či. Fizinį aktyvumą papildantys veiksnių buvo sveika mityba ir kognityvinės treniruotės [5].

Iš 16 atrinktų tyrimų, 4 tyrimai ($n = 1885$) siekė nustatyti daugiakomponenčio fizinio aktyvumo naudą, siekiant užkirsti kelią ADRD [6–9]. Klinikiniai tyrimai truko nuo 6 mėnesių iki 2 metų, o tyrimo dalyviai dalyvavo lankstumo, jégos, pusiausvyros, ištvermės ir aerobinėse treniruotėse. Didžiausiaime iš 4 tyrimų ($n = 1635$) po dvejų metų nerasta reikšmingų skirtumų tarp tiriamosios ir kontrolinės grupių galimybės susirgti demencija ar iegyti MCI. Vertinant šiu 4 tyrimų rezultatus, atlikti 25 palyginimai, iš kurių tik 3 parodė statistiškai reikšmingą daugiakomponenčio fizinio aktyvumo įtaką mažinant tikimybę susirgti ADRD.

Kiti 6 tyrimai ($n = 531$) buvo atlikti siekiant įvertinti aerobinių treniruočių veiksmingumą ADRD prevencijai [10–15]. Vienas tyrimas ($n = 170$) nustatė, kad, praėjus 18 mėnesių nuo tyrimo pabaigos, tų asmenų, kurie aktyviai dalyvavo aerobinėse treniruotėse, tikimybė susirgti demencija buvo sumažėjusi, lyginant su kontroline tyrimo grupe. Tačiau iš visų 35 rezultatų, gautų iš šių 6 tyrimų, tik 11 rezultatų buvo statistiškai reikšmingi ir rodė teigiamą įtaką, lyginant su kontroline grupe. Trys tyrimai ($n = 315$) tyre jégos pasipriešinimo treniruočių efektyvumą, siekiant sustabdyti kognityvinių gebėjimų pablogėjimą [16–18]. Nė vienas iš trijų tyrimų neparodė reikšmingų rezultatų. Vienas tyrimas ($n = 93$) lygino rezultatus, kai vieni tyrimo dalyviai dalyvavo tai či treniruotėse, o kontrolinės grupės dalyviai nebuvvo fiziškai aktyvūs, tačiau šio tyrimo rezultatai nebuvvo vienareikšmiškai teigiami [8].

Tyrimų metu, kuriuose fizinis aktyvumas buvo derinamas su tinkama mityba (du tyrimai, $n = 79$), dalyviai buvo lyginami su kontroline grupe [6, 19]. Vienas tyrimas su jungė tinkamą mitybą su 90 minučių daugiakomponentėmis fizinėmis treniruotėmis tris kartus per savaitę, vienerius metus. Kitas tyrimas sujungė tinkamą mitybą ir grupines aerobines treniruotes ir truko 6 mėnesius. Nė vieno tyrimo rezultatai nebuvvo statistiškai reikšmingi. Van de Rest su kolegomis išanalizavo du tyrimus, kurių metu dalyviams buvo paskirtas fizinis aktyvumas ir maisto papildai, turintys baltymą [20, 21]. Abu tyrimai truko po 24 savaites. Tik vienas iš 11 dėmesio koncentraciją ir informacijos apdorojimą vertinančių kognityvinių testų ir nė vienas iš 6 atmintį vertinančių kognityvinių testų nustatė statistiškai reikšmingą teigiamą efektą, lyginant su kontroline grupe. Vienas tyrimas ($n = 134$) kontrolinę grupę lygino su grupe, dalyvaujančia struktūruotuose muzikiniuose užsiėmimuose, kuriuose derintas fizinis aktyvumas ir kognityvinių gebėjimų treniravimas, remiantis muzikos intensyvumu [22]. Tyrimo metu šešis mėnesius dalyviai lankydavo vieną 60 minučių treniruotę per savaitę. Šio, kaip ir ankstesnių tyrimų, rezultatai, siekiant įrodyti naudą išvengiant ADRD, buvo statistiškai nereikšmingi.

Paskutinis klinikiniai tyrimai nagrinėtas fizinio aktyvumo būdas – fizinio aktyvumo, sveikos mitybos ir kogni-

tyvinių treniruočių derinimas. FINGER (angl. *Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability*) tyrimė ($n = 1260$) lygintos kontrolinė grupė ir grupė, kuriai pritaikyta ADRD prevencinė programa, iš kurią jėjo asmeninio mitybos plano sudarymas, nuo 1 iki 3 aerobinių treniruočių per savaitę, nuo 2 iki 5 jégos pasipriešinimo treniruočių per savaitę ir grupinių bei individualių kognityvinių gebėjimų gerinimo treniruočių [23]. Tyrimo trukmė – dveji metai. Po dvejų metų tyrimo dalyvių neuropsichologinių testų rezultatai buvo 25 % geresni nei kontrolinės grupės. Vertinant kontrolinės grupės ir aktyvių tyrimo dalyvių atmintį, statistiškai reikšmingo skirtumo nerasta.

Remiantis Brasure su kolegomis atlikta sisteminė analize [5], vien fizinio aktyvumo taikymas ADRD prevencijai nėra efektyvus. Vienintelis tyrimas, kurio teigiamiems rezultatams pakako duomenų ir įrodymų, yra FINGER tyrimas. Jo metu fizinis aktyvumas, tinkama mityba ir kognityvinės treniruotės taikytos kompleksiškai, siekiant užkirsti kelią keliems rizikos veiksniams iš karto (ADRD, širdies ir kraujagyslių ligoms, nutukimui, diabetui). Nagrinėtiems tyrimams, kurių metu ADRD prevencijai taikytas tik fizinis aktyvumas, trūksta įrodymų dėl tiesioginės įtakos kognityviniams gebėjimams [5]. Tačiau tai neįrodo, kad vien fizinis aktyvumas nėra efektyvi ADRD prevencijos priemonė – atlikti tyrimai nebuvvo pakankamai ilgi ar pakankamai svarūs, siekiant įvertinti tikrą fizinio aktyvumo naudą. Fizinis aktyvumas gali sumažinti riziką susirgti ADRD tiek tiesiogiai (pagerina kraujotaką), tiek netaisiogiai (veikdamas kitus ADRD skatinančius rizikos faktorius, tokius kaip širdies ir kraujagyslių ligos, nutukimas, diabetas). Nagrinėtuose tyrimuose dauguma dalyvių tapo fiziškai aktyvūs po daugybės metų fiziškai neaktyvaus gyvenimo būdo, taigi mažai tikėtina, kad tai efektyviai apsaugotų nuo ADRD ir MCI. Taip pat sunku lyginti rezultatus dėl nevienodos tyrimų trukmės, dalyvių skaičiaus, stipriai kintančio fizinio krūvio ir sudėtingo kognityvinių gebėjimų vertinimo dėl skirtinguų testų ir skalių. Siekiant išsiaiškinti, ar fizinis aktyvumas yra efektyvi prevencijos priemonė, tai turėtų gana ankstiapti žmogaus gyvenimo būdo dalimi. Ateities tyrimai galėtų koncentruotis į asmenis, kurie fizinį aktyvumą pavertė savo gyvenimo dalimi, ir ilgesnį laiką stebeti, ar šis fizinis aktyvumas turi teigiamos įtakos kognityviniams gebėjimams. Remiantis nagrinėtais tyrimais, fizinis aktyvumas vyresnio amžiaus žmonėms gali būti efektyvi prevencijos priemonė, siekiant išvengti ADRD, tik jei jis inkorporuojamas kartu su kitaais veiksniais (sveika mityba ir kognityvinės treniruotėmis), kaip ir buvo parodyta FINGER tyrimė. Išvadų, kad vien fizinis aktyvumas yra efektyvi prevencinė ADRD priemonė, negalima daryti dėl įrodymų trūkumo.

MEDIKAMENTINIS GYDYMAS

Kartu su fiziniu aktyvumu, kitas dažnai įvardijamas prevencinės demencijos, AL ir lengvo kognityvinio sutrikimo gydymas yra farmakologinis (medikamentinis). Apžvel-

giamas 51 klinikinis tyrimas, kurio metu buvo bandoma išsitikinti specifinio medikamentinio gydymo efektyvumu bei saugumą siekiant užkirsti kelią ADRD [24]. Dalis iš 51 atrinkto tyrimo pašalinta dėl didelės šališkų rezultatų tikimybės. Medikamentinis gydymas taikytas tiek normalių kognityvinių gebėjimų dalyviams, tiek dalyviams su lengvu kognityviniu sutrikimu. Klinikinių tyrimų medikamentinį gydymą ADRD prevencijai sudarė vaistai demencijai, hipertenzijai ir cukriniam diabetui gydyti, cholesterolio koncentraciją mažinantys vaistai, nesteroidiniai priešūzdegiminiai vaistai (NVNU) ir hormonų terapija.

Tyrimuose, kuriuose taikyti vaistai demencijai gydyti, rasta, kad dalyviai, turintys MCI ir gavę acetilcholinesterazės inhibitorių, rodė tokius pat rezultatus, kaip ir dalyviai, turintys MCI, bet gavę placebą. Didžioji dalis išvadų gauta tyriame [25, 26], kurio dalyviams ($n = 512$) atsitiktiniu būdu buvo paskirtas donepezilis arba placebas. Visgi, po trejus metus trukusio tyrimo nebuvo rasta statistiškai reikšmingų skirtumų tarp abiejų tyrimo grupių kognityvinių gebėjimų ar AL progresavimo. Rasta, kad tų dalyvių, kurie turėjo mažiausiai 1 apolipoproteino e4 aleljį ir vartojo donepezilį, būklė rečiau progresuodavo į Alzheimerio ligą nei tų, kurie vartojo placebą. Galiausiai nustatyta, kad ši išvada statistiškai nereikšminga. Vienintelės tikslios išvados – dalyviai, vartojo donepezilį, dažniau kentėjo nuo šalutinio poveikio, kaip skrandžio veiklos sutrikimai, miego sutrikimai ar artritas [24].

Kita tyrimų grupė tyrė galimą vaistų nuo hipertenzijos naudą, siekiant išvengti ADRD. 8 unikaliose tyrimuose ($n = 31\ 287$) ieškota skirtumų tarp kontrolinės grupės, vartojančios placebą, ir grupės, vartojančios vaistus nuo hipertenzijos. Nustatyta, kad asmenims, dalyvavusiems tyrimė ir turintiems normalius kognityvinius gebėjimus, antihipertenzinis gydymas, palyginti su kontroline placebo grupe, nesumažina demencijų pavojaus. Taip pat nerasta jokio skirtumo tarp abiejų grupių rezultatų, atlikus kognityvinių gebėjimų vertinimo testus. Kitas tyrimas ($n = 1\ 439$, vidutinis dalyvių amžius – 62,4 metų) siekė išsiaiškinti standartinio ir intensyvaus antihipertenzinio gydymo naudą ADRD prevencijai [27]. Dalyviai nesirigo ADRD ir neturėjo MCI, sirgo diabetu ir turėjo padidėjusią kardiovaskulinį ligų riziką. Dviejų tyrimo grupių dalyviai turėjo 40 mėnesių palaikyti mažesnį nei 120 mmHg ir mažesnį nei 140 mmHg sistolinį kraujospūdį, vartodami antihipertenzinius vaistus. Pasibaigus tyrimui, skirtumų tarp abiejų grupių, vertinant ADRD susirginimus ir išgytą lengvą kognityvinį sutrikimą, nerasta. Dar 9 tyrimuose ($n = 28\ 933$) siekta išsiaiškinti antihipertenzinių vaistų įtaką ADRD prevencijai, lyginant skirtingus vaistus. Tyrimų išvados parodė, kad skirtinė antihipertenzinė vaistai neturėjo įtakos dalyvių kognityvinių testų rezultatams. Didžiausias iš šių tyrimų – ONTARGET (angl. *Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial*), kuriame dalyvavo 25 620 pacientų, nerado statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tiriamųjų grupių, vertinant ADRD riziką. Tyrimai neatskleidė jokio galimo antihipertenzinių vaistų vartojimo teigiamo poveikio ADRD prevencijai [24].

Keturiuose tyrimuose siekta nustatyti galimą cukriniam diabetui gydyti skirtų vaistų efektą, vertinant jų naują ADRD prevencijai [24]. Didžioji dalis rezultatų gauti iš dviejų pagrindinių tyrimų, ACCORD-MIND (angl. *Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes–Memory in Diabetes*) [28, 29] ir ORIGIN (angl. *Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention*) [30]. Bendras šių dviejų tyrimų dalyvių skaicius – 14 662. Tyrimo dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes, kurioms paskirtas skirtingo intensyvumo vaistas cukriniam diabetui gydyti (intensyvesnį gydymo kursą gavusi grupė stebėta 3,3 metų, o standartinį gydymo kursą – 6,2 metų). Vertinant šių tyrimų rezultatus, nepakanka įrodymų ryšiu tarp skirtingo intensyvumo vaistų cukriniam diabetui gydyti ir ADRD prevencijos įrodysti. ORIGIN tyrimas nerado skirtumų tarp grupių, atsižvelgiant į ADRD sergamumą, o vertinant abiejų tyrimų dalyvių kognityvinių testų rezultatus prieita prie vienodos išvados – reikšmingų skirtumų nerasta [31, 32].

7 tyrimuose ($n = 23\ 097$) buvo nagrinėta cholesterolio koncentraciją mažinančių vaistų įtaka ADRD sergamumui ir prevencijai. Šie tyrimai nepateikė pakankamai duomenų, kad būtu įrodytos HMG-KoA reduktazės inhibitorių demencijos ar MCI prevencinės savybės. Didžiausias tyrimas ($n = 20\ 536$) suskirstė dalyvius į dvi grupes ir penkeilius metus vienai iš grupių skyrė kasdien vartoti 40 mg simvastatino, o kitai – placebą. Šiame tyrime taip pat ne-gauta reikšmingų skirtumų tarp dviejų tiriamųjų grupių vertinant ADRD prevenciją, susirginimus ar kognityvinių testų rezultatus. Atskiras tyrimas ($n = 503$) lygino rezultatus grupių, kurių vienai skirtas medikamentinis gydymas statinais ir fenofibratu, o kitai – gydymas vien statinais. Tyrimo išvadose teigama, kad reikšmingo skirtumo, lyginant abiejų grupių kognityvinių testų rezultatus, nerasta [27].

Dviejose klinikiniuose tyrimuose tirta nesteroidinių priešūzdegiminiaių vaistų (NVNU) įtaka, siekiant užkirsti kelią Alzheimerio ligai ir susijusioms demencijoms. Tyrimuose dalyvavo vyresnio amžiaus žmonės, turintys normalius kognityvinius gebėjimus. Remiantis abiejų tyrimų išvadomis, nei NVNU, nei aspirinas neturi įtakos ADRD rizikos mažinimui ar kognityvinių testų rezultatams. ADAPT (angl. *Alzheimer's Disease Anti-Inflammatory Prevention Trial*) tyrimė dalyvavo 2 528 žmonės (vidutinis amžius – 74 metai). Jie buvo suskirstyti į tris grupes, kurių dalyviai vartojo naproxeną, celekoksibą arba placebą [33]. Po vidutiniškai 15 mėnesių tyrimo dalyviams buvo atskleista, kuriai grupei jie priklauso. ADAPT tyrimas parodė, kad, vertinant demencijų sergamumą (tikrinta 8 metai nuo tyrimo pradžios) ir kognityvinių gebėjimų testų rezultatus (testai atliki po 4 metų nuo tyrimo pradžios), néra reikšmingo skirtumo tarp grupių, gavusios placebą, ir kitų dviejų grupių, vartojusių vieną iš NVNU. Vis dėlto, tyrimo dalyviai, vartojo kurį nors iš dviejų NVNU, turėjo daug didesnę riziką susirgti hipertenzija [34]. Rezultatai apie aspirino įtaką ADRD yra gauti iš Moterų sveikatos tyrimo (angl. *Women's Health Study*) subtyrimo, kurio metu 6 377 dalyviams buvo paskirta maža aspirino dozė arba placebas [35].

Daugiausia tyrimų atlikta siekiant ištirti hormoninės terapijos pritaikymą ADRD prevencijai. Hormoninės terapijos tyrimai suskirstyti į estrogenų terapiją, estrogenų ir progesterono terapiją, selektyvių estrogenų receptorų moduliatorių terapiją ir testosterono terapiją. 6 tyrimai nagrinėjo estrogeno poveikį ADRD. Bendra visų tyrimų išvada: estrogenų hormoninė terapija paskatino MCI ir demenciją vystytis, tačiau neturi jokios įtakos kognityvinį testų rezultatams. Tyrimuose dalyvavo moterys, turinčios normalius kognityvinius gebėjimus. Daugiausia informacijos gauta iš WHIMS (angl. *Women's Health Initiative Memory Study*) tyrimo ($n = 2\,947$), kuriamė dalyvavo moterys nuo 65 metų amžiaus. Tyrimo dalyvėms atsitiktine tvarka paskirtas estrogens arba placebas, kurį jos vartojo vidutiniškai 5,2 metų. Rezultatai patvirtino padidėjusią riziką susirgti ir MCI, ir ADRD kartu, bet ne atskirai.

5 tyrimai nagrinėjo estrogeno ir progesterono poveikį ADRD. Kaip ir tyrimuose, kuriuose vartotas tik estrogens, estrogeno ir progesterono hormoninė terapija paskatino tam tikras ADRD, tačiau neturėjo įtakos kognityvinį testų rezultatams. Estrogenas ir progesteronas padidino riziką susirgti demencija. Tyrimuose dalyvavo moterys nuo 65 metų amžiaus, turinčios normalius kognityvinius gebėjimus. 4 532 tyrimo dalyvėms vidutiniškai 4,1 metų atsitiktine tvarka buvo paskirta estrogeno ir progesterono terapija arba placebas. Estrogeną ir progesteroną vartojuosioms tyrimo dalyvėms labai padidėjo rizika susirgti demencija, tačiau tikimybė susirgti MCI arba ir MCI, ir demencija liko nepakitusi.

Du išskirtiniai tyrimai nagrinėjo selektyvių estrogenų receptorų moduliatorių terapijos (raloksifeno) įtaką ADRD. Tyrimo dalyvėms – vyresnio amžiaus moterims, sergančioms osteoporoze, buvo skirta 60 mg raloksifeno per dieną, 120 mg/d raloksifeno per dieną arba placebo [36–38]. Rezultatai gauti kaip MORE (angl. *Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation*) tyrimo subtyrimas [36, 37]. Rasta, kad tyrime dalyvavusios normalių kognityvinį gebėjimą moterys, gavusios 120 mg raloksifeno kasdien, turėjo mažesnę riziką igyti lengvą kognityvinį sutrikimą (MCI), tačiau gydymas neturėjo įtakos tikimybei susirgti ADRD ar MCI ir ADRD kartu. Reikšmingų skirtumų tarp tyrimo dalyvių, gavusių 60 mg raloksifeno dozes ir placebo, nerasta. Trijuose tyrimuose buvo aiškinamas testosterono įtaka ADRD sergamumui ir kognityviniams gebėjimams, tiriant vyresnio amžiaus vyrus su žema testosterono koncentracija. Tyrimo dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes, kurių vienai skirta testosterono terapija, o kitai – placebo. Reikšmingų skirtumų tarp dviejų grupių nerasta. Nustatyta, kad vyrams, praėjusiems testosterono hormonų kursą, padidėjo eritrocitozės tikimybė [39].

Taigi, visi aptarti tyrimai, kurie nagrinėjo ryšį tarp medikamentinio gydymo ir ADRD, padarė tris išvadas: a) estrogenų hormonų terapija galimai padidina riziką susirgti MCI ir demencija kartu (bet ne atskirai); b) estrogenų ir progesterono hormonų terapija galimai labai padidina riziką susirgti demencija (bet ne MCI atskirai ar MCI ir demencija kartu); c) gydymas didesne doze raloksifeno (120 mg per dieną) sumažina tikimybę susirgti MCI (bet ne

demencija ar MCI ir demencija kartu). Norint gauti tikslesnius rezultatus, tyrimai turėtų kuo labiau atitinkti optimalius kriterijus: medikamentinio gydymo tyrimas turėtų nagrinėti kelis rizikos faktorius tuo pat metu, prasidėti, kai tyrimo dalyvis išpėjė gyvenimą, tėstis iki gyvenimo pabaigos, nuolat fiksuoti aktualius duomenis ir pokyčius, reguliarai tikrinti kognityvinius dalyvių gebėjimus standartizuotais testais, rezultatus interpretuoti pritaikant visiems tyrimo dalyviams ir iš anksto numatytomis tyrimo dalyvių subgrupėmis. Visų minėtų sąlygų neįmanoma įgyvendinti dėl per didelių išlaidų ir sudėtingos tyrimo struktūros, tačiau ateities tyrimams rekomenduojama pasistengti orientuotis į daugiau kriterijų [24].

MAISTO PAPILDAI

Didėjantis sergamumas AL, taip pat didėjantis MCI ir demencijų skaičius daro reikšmingą įtaką sparčiai augancią maisto papildų industrijai. Produktų, galimai mažinančių Alzheimerio ligos ir kognityvinį gebėjimą pablogėjimo riziką, paklausa didėja – 63 % vyresnio amžiaus žmonių vartoja maisto papildus, galimai gerinančius atmintį ir kognityvinius gebėjimus [40]. Vis dėlto, šiu produktų reklamuojamas poveikis nėra įrodytas. Sisteminiéje Butler ir kolegų apžvalgoje atrinkti klinikiniai bandymai, vykdyti nuo 2009 iki 2017 m. liepos mėnesio [41]. Iš viso atrinkti ir susisteminti 38 tyrimai, kurie nagrinėja maisto papildų galimą naudą ADRD prevencijai ir kognityvinį gebėjimą išlaikymui. Tyrimo dalyviai – normalių kognityvinį gebėjimą žmonės arba asmenys, turintys lengvą kognityvinį sutrikimą, bet ne demenciją ir nesergantys AL. Maisto papildai suskirstyti į omega-3 riebalų rūgštis, soją, ginkmedį, B grupės vitaminus (olio rūgštį, folio rūgštį ir vitaminą B₁₂, folio rūgštį kartu su vitaminais B₆ ir B₁₂), vitaminą D ir kalcij, vitaminą C arba -karoteną, multivitaminus ir kelių komponentų papildus bei kitus maisto papildus.

7 klinikiniuose tyrimuose ($n = 21\,027$) tirta omega-3 riebalų rūgščių nauda kognityviniams gebėjimams ir galimybės taikyti šį papildą ADRD prevencijai. Tyrimuose dalyvavo normalius kognityvinius gebėjimus turintys asmenys, kuriems atsitiktiniu būdu buvo skirtos omega-3 riebalų rūgštys arba placebas. Preparatai vartoti nuo 6 mėnesių iki 6 metų. Viename iš tyrimų kaip papildas buvo skriama dokozahekseno rūgštis (DHR) [42], likusiuose šešiuose tyrimuose papildas buvo sudarytas kombinuojant eikozapentaeno rūgštį (EPR) su DHR. Bendra visų septynių tyrimų išvada – nerasta pakankamai svarių įrodymų, rodančių teigiamą omega-3 riebalų rūgščių įtaką dalyvių kognityviniams gebėjimams. Statistiškai reikšmingų skirtumų kognityvinį testų rezultatuose tarp abiejų grupių nerasta, o iš bendrai atliktų 67 testų (9 trumpi kognityviniai testai; 1 neuropsichologinis testas; 32 testai, tikrinantys dėmesio sutelkimą ir informacijos vertinimo greitį; 25 atminties testai) tik 5 testai rodė daug geresnį rezultatą, lyginant EPR ir DHR papildus vartojuisas grupes su placebo grupėmis. Tačiau teigiami rezultatai gauti iš dviejų tyrimų, kurie buvo vieni trumpiausiai ir kurių dalyviai sudarė apie 5 %

nuo visų minėtų 7 tyrimų [42, 43]. Informacijos apie galimą prevencinį poveikį tyrimuose nepateikta. Taip pat išnagrinėtas vienas papildomas tyrimas, kuriame dalyvavo asmenys, turintys lengvą kognityvinį sutrikimą (MCI) [41]. Tarp dalyvių grupių, kurios metus vartojo arba omega-3 riebalų rūgštis, arba placebo, reikšmingų skirtumų nerasta dėl trumpos tyrimo trukmės ir mažo dalyvių skaičiaus ($n = 36$) [44].

Penki tyrimai, kurių kiekviename dalyvavo nuo 35 iki 350 dalyvių ($n = 829$) ir truko nuo 6 mėnesių iki 2,5 metų, lyginio sojos maisto papildų įtaką kognityviniams gebėjimams su placebo. Tyrimuose dalyvavo normalių kognityvinų gebėjimų vyresnio amžiaus asmenys, kurių protinės būklės mini tyrimo (angl. *Mini-Mental State Examination*, MMSE) rezultatai svyraido nuo 28 iki 29 [45–48]. Tyrimų pabaigoje nefiksotas nė vienas ADRD ar MCI susirgimas. Nustatyta, kad nepakanka įrodymų spręsti apie sojos maisto papildų įtaką trumpą kognityvinį ir neuropsichologinių testų rezultatams. Po 2,5 metų atlikus dėmesio sutelkimą, informacijos vertinimo greitį ir atmintį vertinančius kognityvinius testus, sojos maisto papildai šių testų rezultatams reikšmingos įtakos neturėjo [41]. Ivertintas ir vienas papildomas tyrimas ($n = 78$), kuriame dalyvavo asmenys, turintys lengvą kognityvinį sutrikimą. Dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes, kurių kiekviena kasdien vartojo placebo arba 100/300 mg iš sojų pupelių išgautą fosfatidilseriną. Palyginus visų tiriamujų grupių kognityvinų testų rezultatus po 9 tyrimų mėnesių, reikšmingų skirtumų tarp grupių nerasta [47].

Trijuose tyrimuose ($n = 5\ 559$) siekta rasti galimą dvišliaučio ginkmedžio (ginkgo biloba) teigiamą efektą, gerinant ar palaikant kognityvinius žmogaus gebėjimus. Tyrimų trukmė – iki 6 metų. Dalyviai buvo suskirstyti į grupes, kurioms skiriamas ginkmedžio ekstraktas (240 mg per dieną), ir placebo grupę [49–52]. Tyrimuose dalyvavo nuo 118 iki 3 069 asmenų, kurie pagal amžių buvo suskirstyti į grupes: nuo 70 metų [52], nuo 75 metų [49, 51] ir nuo 85 metų [50]. Dviejose iš trijų tyrimų buvo nustatyta, kad ginkmedžio ekstrakto vartojimas neturėjo įtakos kognityvinų gebėjimų gerinimui ar išlaikymui [49–52]. Reikšmingo skirtumo tarp tyrimo grupių, vertinant kognityvinų gebėjimų rezultatus, nerasta [41]. Papildomame 6 mėnesius trukusiam tyrome ($n = 160$) analogiskai buvo tiriamas ginkmedžio teikiama nauda kognityviniams žmonių gebėjimams, tačiau, priešingai nuo ankstesnių trijų tyrimų, dalyviai pasirinkti asmenys, turintys lengvą kognityvinį sutrikimą. Ginkmedžio ekstrakto vartojimas neturėjo įtakos ADRD sergamumui MCI turintiems tyrimo dalyviams, tačiau rastas mažas teigiamas poveikis vertinant dalyvių dėmesio sutelkimą ir informacijos vertinimo greitį [53].

B grupės vitamininės poveikis ADRD, MCI ir kognityviniams žmonių gebėjimams tirtas skaidant B grupės vitamininės elementus į šias grupes – folio rūgštį, folio rūgštį ir vitamīnā B₁₂ bei folio rūgštį kartu su vitaminais B₆ ir B₁₂. Vieninteliu klinikiniu tyrimu ($n = 818$) siekta nustatyti folio rūgšties poveikį Alzheimerio ligai, susijusioms demencijoms ir normalių kognityvinų gebėjimų palaikymui [54]. Tyrome dalyvavo normalių kognityvinų gebėjimų asme-

nys (vidutinis MMSE vertinimas – 29/30), kuriems trejus metus kasdien buvo skiriama 0,8 mg folio rūgšties arba placebo. Folio rūgšties nauda, vartojant ši maisto papildą ADRD ir MCI prevencijai ir normalių kognityvinų gebėjimų išlaikymui, neįrodyta.

Du klinikiniai tyrimai ($n = 3\ 819$) lygino dalyvių kognityvinų testų rezultatus (dėmesio sutelkimo, informacijos vertinimo greičio ir atminties) po dvejus metus trukusių tyrimų, kurių metu vienai grupei kasdien buvo skiriama 0,4 mg folio rūgšties ir nuo 0,1 iki 0,5 mg vitamino B₁₂, o kitai – placebo [55, 56]. Nors tyrimo pabaigoje neužfiksotas nė vienas susirgimas AL ar MCI, reikšmingo skirtumo tarp grupių, vertinant dėmesio sutelkimo ir informacijos vertinimo greičio testų rezultatus, nerasta. Taip pat nustatyta, kad dalyvių, vartojuisi folio rūgštį ir vitamīnā B₁₂, atminties testų rezultatai buvo šiek tiek geresni nei placebo grupės [41]. Atlikti du tyrimai ($n = 1\ 524$), siekiant ištirti trijų elementų naudą kognityviniams žmogaus gebėjimams [57, 58]. Normalių kognityvinų gebėjimų tyrimų dalyviai suskirstyti į dvi grupes, kurios nuo 2 iki 4 metų kasdien vartojo placebo arba folio rūgštį (nuo 0,56 iki 1,0 mg), vitamīnā B₆ (nuo 3 iki 10 mg) ir vitamīnā B₁₂ (nuo 0,2 iki 0,5 mg). Tyrimų rezultatai neparodė reikšmingo skirtumo, vertinant dalyvių trumpą kognityvinį ar atminties testų rezultatus. Įrodymų, norint daryti prielaidas apie folio rūgšties, vitamīno B₆ ir vitamīno B₁₂ efektą dalyvių dėmesio sutelkimiui ir informacijos vertinimo greičiu, nepakako. Dar vienas papildomas tyrimas ($n = 217$) tyrė folio rūgšties, vitamīno B₆ ir vitamīno B₁₂ efektą, tačiau šio tyrimo dalyviai turėjo lengvą kognityvinį sutrikimą. Statistiskai reikšmingų skirtumų, vertinant dalyvių kognityvinų gebėjimų pokyčius tarp grupių, nerasta; tiksliam tyrimo rezultatų interpretavimui trukdė ir maža imtis (mažiau nei 500 dalyvių) [59–62].

Vienas tyrimas ($n = 4\ 143$) aiškinosi galimą vitamino D ir kalcio teigiamą efektą MCI bei ADRD prevencijai. Dvi dalyvių grupės kasdien vartojo 0,01 mg vitamino D₃ ir 1000 mg kalcio arba placebo [63]. Tyrimas truko vidutiniškai 7,8 metų, o dalyviai, kuriems buvo paskirta vartoti vitamīnā D₃ ir kalcij, savo noru papildomai galėjo vartoti iki 600 mg vitamino D ir 1 000 mg kalcio kasdien. Tyrimo rezultatai neparodė statistiskai reikšmingo skirtumo tarp grupių, vertinant riziką susirgti ADRD ar MCI [41].

trys tyrimai ($n = 12\ 830$), kurių trukmė – nuo 9 iki 10 metų, tyrė galimą vitamino E įtaką ADRD sergamumui, kasdien vartojant nuo 270 iki 400 mg. Tyrimuose dalyvavo normalių kognityvinų gebėjimų vyrai [64] ir moterys [65, 66]. Tyriame, kuriame dalyvavo vyrai, nustatyta, kad, lyginant su placebo grupe, vitamino E vartojimas nedarė jokios įtakos tikimybėi susirgti demencija. Likusių dviejų tyrimų rezultatai neparodė reikšmingo skirtumo tarp grupių, vertinant dalyvių trumpą kognityvinų testų, neuropsichologinių testų ar atminties testų rezultatus. Vieno papildomo tyrimo metu ($n = 516$, dalyviai, turintys MCI) nustatyta, kad dalyviams, 3 metus kasdien vartojuisems 2 000 TV vitamino E [25], ir dalyviams, tą patį laikotarpį vartojuisems placebo, tikimybė susirgti ADRD nesiskyrė.

Viename tyrome ($n = 2\ 824$) siekta rasti ryšį tarp kasdienio vitamino C ir -karoteno vartojimo bei kognityvinų

gebėjimų kitimo. Dalyviamas buvo paskirta kasdien vartoti 500 mg vitamino C, 50 mg -karoteno arba placebo [65]. Nors tyrimas truko devynerius metus, pagrindiniai rezultatai buvo gauti po ketverių metų nuo tyrimo pradžios. Tyrimo rezultatai nerodė reikšmingų skirtumų tarp visų trijų grupių, vertinant jų trumpą kognityvinį testų, neuropsychologinių testų ir atminties testų rezultatus.

Dar viena tūra maisto papildų kategorija ir jos efektas ADRD, MCI ir kognityviniams gebėjimams – multivitaminai. Keturi tyrimai ($n = 27\ 613$, dalyviai yra normalių kognityvinių gebėjimų) vertino kognityvinius gebėjimus ir sergamumą ADRD bei MCI, lygindami dalyvių grupes, vartojujas multivitaminus, su grupėmis, vartojujosiems placebo [67–70]. Nagrinėjamuose keturiuose tyrimuose dalyvių grupės vartojo multivitaminus skirtingomis dozėmis ir šiu medžiagų kombinacijomis: vitaminus A, B, C, D, ir E, -karoteną, biotiną, kobalaminą, varį, folio rūgštį, jodą, geležį, magnij, manganą, niaciną, pantoteno rūgštį, pirdoksiną, riboflaviną, seleną, tiaminą ir cinką. Tyrimų dalyvių skaičius svyraudo nuo 1 130 iki 20 536, trukmė – nuo 6 mėnesių iki 8,5 metų. Didžiausio tyrimo ($n = 20\ 536$) išvadose teigama, kad, pasibaigus tyrimui, statistiškai reikšmingo skirtumo tarp dviejų grupių, vertinant ADRD ir MCI sergamumą, nerasta [68]. Vertinant kognityvinių gebėjimų testų (neuropsychologinio testo, testų, tikrinančių dėmesio sutelkimą ir informacijos vertinimo greitį, ir atminties testo) rezultatus, tarp abiejų grupių reikšmingų skirtumų nerasta [41]. Papildomo tyrimo ($n = 256$, dalyviai, turintys lengvą kognityvinį sutrikimą) įrodymai buvo nepakankami, siekiant įvertinti vitamino E (300 mg kasdien) ir vitamino C (400 mg kasdien) įtaką asmenų, turinčių MCI, kognityviniams gebėjimams po vienerių metų [71]. Po vieną tyrimą atlikta, siekiant įrodyti ryšį tarp kognityvinių gebėjimų ir dehidroepandrosterono, raudonujų dobilų, resveratrolio ar augalinių sterolių ir stanolių vartojimo, tačiau dėl mažos imties ir mažo kieko tyrimų nepakanka rezultatų ryšiui įrodyti [41].

Nagrinėtuose tyrimuose apžvelgta gana maža pasiūloje esančių maisto papildų, galimai gerinančių ar palaikančių kognityvinius gebėjimus, dalis. Dauguma minėtų tyrimų siekė išsiaiskinti ryšį tarp maisto papildo vartojimo ir kognityvinių gebėjimų testų rezultatų, bet ne maisto papildų taikymo ADRD ir lengvo kognityvinio sutrikimo prevencijai, be to, tik maža dalis tyrimų įtraukė asmenis, turinčius lengvą kognityvinį sutrikimą. Apibendrinant nagrinėtų tyrimų rezultatus, minėtų maisto papildų nauda, siekiant palaikyti ar pagerinti kognityvinius gebėjimus, yra labai menka arba jos apskritai nėra. Nėra pakankamai įrodymų, kad plačiai reklamuojami maisto papildai, galimai gerinantys ar palaikantys kognityvinius gebėjimus, galėtų būti rekomenduojami.

KOGNITYVINĖS TRENIRUOTĖS

Analogišką maisto papildų industrijai augimą šiuo metu išgyvena ir kognityvinių treniruočių sritis. Kognityvinės treniruočės pirkėjams žada išlaikyti esamus kognityvinius ge-

bėjimus arba juos pagerinti. Tačiau nėra iki galio įrodyta, ar kognityvinės treniruočės tikrai duoda teigiamą efektą kognityviniams žmonių gebėjimams ir ar gali būti naudojamos ADRD ir MCI prevencijai. Iš 35 identifikuotų klinikinių bandymų, remiantis šališkumo kriterijumi, atrinkta 11 tyrimų, iš kurių 6-iuose dalyvavo normalių kognityvinių gebėjimų asmenys, o likusiųose 5 tyrimuose – dalyviai, turintys lengvą kognityvinį sutrikimą [72].

Tyrimuose, kuriuose dalyvavo normalių kognityvinių gebėjimų asmenys, dalyvių skaičius svyraudo nuo 40 iki 2 832, o kognityvinės treniruočės buvo vykdomos nuo 2 savaičių iki 6 mėnesių. Trys tyrimai treniruočėms naujojo vien kompiuterius [73–75], 2 tyrimuose pasitelkti tiek kompiuteriai, tiek nekompiuterinės mokymo priemonės [76, 77], o viename tyime vykdysti grupiniai užsiėmimai [78]. Didžiausias iš 6 tyrimų ($n = 2\ 832$) – ACTIVE, suskirstė dalyvius (vidutinis amžius – 74 metai) į 4 grupes. 3 tyrimo dalyvių grupės gavo aktyvias kognityvines treniruotes atminties, mąstymo arba informacijos apdorojimo greičio srityje, o paskutinė grupė buvo palikta kontrolei [76]. Iš viso dalyviamas skirta per 6 savaites 10 treniruočių po 60–70 minučių. Dalyviai buvo testuojami tik toje kognityvinėje srityje, kurios treniruočėse jie dalyvavo. Vertinant tyrimo rezultatus, nustatyta, kad asmenų, dalyvavusių kognityvinėse treniruočėse, rezultatai pagerėjo, lyginant su kontroline grupe, tačiau tik toje srityje, kuri buvo priskirta. Įrodymų apie šiame tyime pasitelktų kognityvinių treniruočių įtaką ADRD ir MCI prevencijai nerasta.

IHAMS tyime (angl. *the Iowa Healthy and Active Minds Study*) ($n = 681$) dalyviai buvo suskirstyti pagal amžių (grupė nuo 50 iki 64 metų ir grupė, kuriems per 65 metus) ir jiems paskirtos specifinės kognityvinės treniruočės: kognityvinės vaizdinės informacijos apdorojimo treniruočės mokymo centre, kognityvinės vaizdinės informacijos apdorojimo treniruočės dalyvių namų kompiuteriuose arba kompiuterinių kryžiažodžių sprendimas (kontrolinė grupė) [73]. Mokymai truko dvi valandas kartą per savaitę ir tėsėsi 5 savaites. Treniruočių efektas tirtas naudojantis taškų jungimo (angl. *trail making test*) testo A ir B dalimis. A dalyje dalyviai turi kuo greičiau ir tiksliau jungti skaičiais pažymėtus taškus, o B dalyje taškai yra pažymėti tiek skaičiais, tiek raidėmis. Remiantis tyrimo išvadomis, dalyviai, kurie treniravosi prie kompiuterių namuose, po mokymų pagerino tiek A, tiek B dalies testų rezultatus, lyginant su kontroline grupe. Dalyviai, kurie dalyvavo treniruočėse, rengiamose mokymo centruose, pagerino tik A dalies rezultatus, lyginant su kontroline grupe. Įrodymų apie šiame tyime pasitelktų kognityvinių treniruočių įtaką ADRD ir MCI prevencijai nerasta.

Kito tyrimo ($n = 84$) metu dalyviai buvo suskirstyti į kontrolinę ir treniruočių grupes. 8 savaites (5 kartus per savaitę) vykdytos 20–25 minučių 6 sričių kognityvinės treniruočės (trumpalaikės ir ilgalaikės atminties, kalbos, erdvės, mąstymo ir skaičiavimo) [75]. Gauti tyrimo rezultatai, kad minėtos treniruočės pagerino tik ilgalaikės atminties rezultatus. Lyginant kitus rezultatus su kontroline grupe, statistiškai reikšmingų skirtumų nerasta.

Carretti su kolegomis atliktame tyrime [77] ($n = 40$) individualias kognityvinės treniruotes gavę dalyviai lyginti su kontroline grupe. Treniruotėse atmintis lavinta pasitelkiant garso įrašus ir tekstą. Per dvi savaites dalyviai turėjo dalyvauti trijose kognityvinėse treniruotėse, kurių trukmė svyraovo nuo 50 iki 70 minučių. Vertinant tyrimo rezultatus po 6 mėnesių, nustatyta, kad dalyvių rezultatai, apdorojant garsinę informaciją, buvo geresni nei kontrolinės grupės. Po 6 mėnesių vertinant teksto apdorojimo gebėjimus, reikšmingo skirtumo tarp grupių nerasta.

Klusmann su kolegomis [74] ($n = 259$) tyrime nagrinėjo grupės, kuriai paskirtos kompiuterizuotos kognityvinės treniruotės, ir kontrolinės grupės skirtumus. Treniruotės vykdavo apie 90 minučių 3 kartus per savaitę puse metų. Treniruotės apémė mokymasi naudotis el. paštu ir internetu, fotograuoti ar redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, žaisti žaidimus, apdoroti tekstus ir piešti. Vertinant rezultatus po 6 mėnesių, kognityvinėse treniruotėse dalyvavusi grupė statistiškai reikšmingai pagerino trumpalaikės ir ilgalaikės atminties testų rezultatus, palyginti su kontroliniais dalyviais.

Paskutinis iš 6 tyrimų [78] ($n = 461$, vidutinis dalyvių amžius – 73 metai) lygino grupinių ir individualių kognityvinės treniruočių rezultatus su kontroline grupe. Tieki grupinės, tiek individualios treniruotės vykdavo kartą per savaitę. Grupinių treniruočių metu dalyviai buvo skirstomi į komandas, kurios buvo vertinamos pagal gebėjimą priimti inovatyvius problemų sprendimus. Individualios treniruotės koncentravosi ties indukcinio mąstymo lavinimu. Treniruotės truko 16 savaičių. Atlikus kognityvinius testus po 8 mėnesių nuo tyrimo pradžios, nustatyta, kad, lyginant su kontroline grupe, tiek individualių, tiek grupinių treniruočių dalyviai rodė geresnius testų rezultatus toje srityje, kuriuoje buvo lavinami.

Penki tyrimai atliki su asmenimis, turinčiais lengvą kognityvinį sutrikimą. Dalyvių skaičius svyraovo nuo 19 iki 223. Beveik visų tyrimų vienas pagrindinių kognityvinės treniruočių komponentų buvo atminties lavinimas, o tyrimai truko nuo 6 savaičių iki 6 mėnesių. Kwok su kolegomis tyrime ($n = 223$, vidutinis MMSE įvertis – 26/30) vadovavosi ACTIVE tyrimo gairėmis [79]. Kognityvinės treniruotės vykdavo apie 1,5 valandos kartą per savaitę, 12 savaičių. Atliekant kognityvinius testus po metų nuo tyrimo pradžios, statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tiriamosios ir kontrolinės grupių nerasta. Kitas tyrimas ($n = 160$) koncentravo treniruotes į dėmesio sutelkimą, atmintį ir informacijos apdorojimą [80]. Dalyviams du kartus per savaitę, 5 savaites buvo rengiamos 90 minučių trukmės sesijos. Besibaigiant tyrimui, iš viso atlikta 11 kognityvinių testų, kurių nė vienas rezultatas nerodė reikšmingo skirtumo, lyginant su kontroline grupe.

Buschert su kolegomis ($n = 24$, vidutinis MMSE įvertis – 26/30) tyrimo dalyviams 6 mėnesius rengė 2 valandų trukmės savaitinius ir socialinio įsitraukimo mokymus. Tyrimo dalyviai rodė nedaug geresnius 1 iš 2 kognityvinių testų rezultatus, tačiau dėl mažos imties yra sunku vertinti rezultatus.

Kitas tyrimas ($n = 22$, vidutinis MMSE įvertis – 27/30) skyrė dalyviams kompiuterizuotas atmintį ir dėmesį lavinancias kognityvinės treniruotes [81]. Treniruotės vykdavo dvi valandas per savaitę, 12 savaičių. Kognityvinėse treniruotėse dalyvavę asmenys kognityvinį gebėjimą gerėjimą rodė 4 iš 9 kognityvinių testų. Paskutiniame tyrime ($n = 19$, vidutinis MMSE įvertis – 28/30) Rapp su kolegomis siekė nustatyti atmintį gerinančių kognityvinį treniruočių įtaką asmenims, turintiems lengvą kognityvinį sutrikimą. Tyrimo dalyviai 6 savaites dalyvavo 2 valandų trukmės atminties treniruotėse. Vertinant testų rezultatus po 6 mėnesių, reikšmingų skirtumų tarp grupių nerasta [82].

Dauguma žmonių, dalyvaujančių kognityvinėse treniruotėse, tikisi išvengti demencijos ar susijusių kognityvinės sutrikimų, tačiau, remdamiesi nagrinėtais tyrimais, negalime daryti išvadą, kad kognityvinės treniruotės turi įtakos tikimybei susirgti ADRD ar MCI [72]. Dauguma tyrimų neminėjo rezultatų, susijusių su ADRD ar MCI, o pagrindiniai sėkmingsi kognityvinės treniruočių rodikliai buvo kognityvinių testų rezultatai. Remiantis tyrimais, nustatyta, kad normalių kognityvinų asmenų rezultatai treniruotoje srityje buvo geresni sudalyvavus kognityvinėse treniruotėse. Dalyvių rezultatai kito tik tose srityse, kurių treniruotėse jie dalyvavo [73, 76–78]. Reikšmingų skirtumų tarp kontrolinės ir tiriamosios grupių, kai tyrimo dalyviai turėjo lengvą kognityvinį sutrikimą, nerasta. Remiantis esamais tyrimais, nepakanka įrodymų, kad kognityvinės treniruotės darytų įtaką ADRD ir MCI sergamumui ar padėtų sulėtinti kognityvinių gebėjimų prastėjimą [72].

IŠVADOS

Vertinant nagrinėtų 4 sisteminių analizių rezultatus, nerasta nė vieno efektyvaus gydymo metodo, užkertančio kelią ADRD ir MCI. Kai kurie nagrinėti tyrimai rodė teigiamus rezultatus – fizinis aktyvumas kartu su kitais riziką mažinančiais veiksnių FINGER tyrime lėmė 25% geresnius neuropsychologinių testų rezultatus nei kontrolinės grupės, o kognityvinės treniruočių tyrimai parodė, kad asmenų, turinčių normalius kognityvinius gebėjimus, kognityvinių testų rezultatai gerėjo toje srityje, kuriuoje tyrimo metu buvo treniruotasi. Deja, šie rezultatai neįrodo naudos, taikant minėtus gydymo metodus ADRD ir MCI prevencijai. Medikamentinis gydymas ir maisto papildų vartojimas neįrode savo naudos išlaikant ar pagerinant kognityvinius gebėjimus [83]. Dauguma tyrimų ne tik nenustatė nagrinėjamų gydymo metodų efekto Alzheimerio ligos ir susijusių demencijų prevencijai, bet ir daugeliu atveju trūko įrodymų pagrindimo [83]. Vertingų išvadų trūkumas įrodo Alzheimerio ligos ir demencijų rizikos veiksnių tyrimų komplikacijas ir apribojimus – atliekami salyginai trumpi tyrimai, nors liga atsiranda gerokai prieš pasireiškiant simptomams. Siekiant atliki efektyvesnius tyrimus, turėtų būti atrinkti vidutinio amžiaus dalyviai ir iki jų senatvės stebimi riziką didinantys ar mažinantys veiksnių. Tačiau

tokie tyrimai yra mažai tikėtini dėl sudėtingos priežiūros, didelių sąnaudų ir galimai didelės dalyvių kaitos. Dėl įrodymų trūkumo, nei fizinis aktyvumas, nei medikamentinis gydymas, nei maisto papildų vartojimas, nei kognityvinės treniruotės nesumažina tikimybės susirgti ADRD ir MCI, naudojant šiuos metodus atskirai. Didžiausia tikimybė užkirsti kelią ADRD ar bent jau atidėti ligą yra kompleksiškas sveikos gyvensenos palaikymas – būti fiziškai aktyviams, nerūkyti, bendrauti ir būti socialiam, vengti veiksmių, didinančių riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis ir diabetu, palaikyti tinkamą mitybą ir sveiką svori, taip pat koreguoti suprastėjusią klausą ar regą [83].

Literatūra

- Prince M, Ali GC, Guerchet M, Prina AM, Albanese E, Wu YT. Recent global trends in the prevalence and incidence of dementia, and survival with dementia. *Alzheimers Res Ther* 2016; 8: 23. <https://doi.org/10.1186/s13195-016-0188-8>
- Kelley A, McGarry K, Gorges R, Skinner J. The burden of health care costs for patients with dementia in the last 5 years of life. *Ann Intern Med* 2015; 163: 729–36. <https://doi.org/10.7326/M15-0381>
- Prince M, Bryce R, Albanese E, Wimo A, Ribeiro W, Ferri CP. The global prevalence of dementia: a systematic review and metaanalysis. *Alzheimers Dement* 2013; 9: 63–75. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2012.11.007>
- Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, Dubois B, Feldman HH, Fox NC, et al. The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement* 2011; 7: 270–9. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.008>
- Brasure M, Desai P, Davila H, Nelson VA, Calvert C, Jutkowitz E, et al. Physical activity interventions in preventing cognitive decline and Alzheimer-type dementia. A systematic review. *Ann Intern Med* 2018; 168(1): 30–9. <https://doi.org/10.7326/M17-1528>
- Napoli N, Shah K, Waters DL, Sinacore DR, Qualls C, Villareal DT. Effect of weight loss, exercise, or both on cognition and quality of life in obese older adults. *Am J Clin Nutr* 2014; 100: 189–98. <https://doi.org/10.3945/ajcn.113.082883>
- Sink KM, Espeland MA, Castro CM, Church T, Cohen R, Dodson JA, et al; LIFE Study Investigators. Effect of a 24-month physical activity intervention vs health education on cognitive outcomes in sedentary older adults: The LIFE randomized trial. *JAMA* 2015; 314: 781–90. <https://doi.org/10.1001/jama.2015.9617>
- Taylor-Piliae RE, Newell KA, Cherin R, Lee MJ, King AC, Haskell WL. Effects of Tai Chi and Western exercise on physical and cognitive functioning in healthy community-dwelling older adults. *J Aging Phys Act* 2010; 18: 261–79. <https://doi.org/10.1123/japa.18.3.261>
- Williamson JD, Espeland M, Kritchevsky SB, Newman AB, King AC, Pahor M, et al; LIFE Study Investigators. Changes in cognitive function in a randomized trial of physical activity: results of the lifestyle interventions and independence for elders pilot study. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2009; 64: 688–94. <https://doi.org/10.1093/gerona/glp014>
- Antunes H, De Mello M, Santos-Galduro R, Galduro J, Lemos V, Tufik S, et al. Effects of a physical fitness program on memory and blood viscosity in sedentary elderly men. *Braz J Med Biol Res* 2015; 48: 805–12. <https://doi.org/10.1590/1414-431X20154529>
- Lautenschlager NT, Cox KL, Flicker L, Foster JK, van Bockxmeer FM, Xiao J, et al. Effect of physical activity on cognitive function in older adults at risk for Alzheimer disease: a randomized trial. *JAMA* 2008; 300: 1027–37. <https://doi.org/10.1001/jama.300.9.1027>
- Muscaria A, Giannoni C, Pierpaoli L, Berzigotti A, Maietta P, Foschi E, et al. Chronic endurance exercise training prevents aging-related cognitive decline in healthy older adults: a randomized controlled trial. *Int J Geriatr Psychiatry* 2010; 25: 1055–64. <https://doi.org/10.1002/gps.2462>
- Oken BS, Zajdel D, Kishiyama S, Flegal K, Dehen C, Haas M, et al. Randomized, controlled, six-month trial of yoga in healthy seniors: effects on cognition and quality of life. *Altern Ther Health Med* 2006; 12: 40–7.
- Okumiya K, Matsubayashi K, Wada T, Kimura S, Doi Y, Ozawa T. Effects of exercise on neurobehavioral function in community-dwelling older people more than 75 years of age. *J Am Geriatr Soc* 1996; 44: 569–72. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1996.tb01444.x>
- Ruscheweyh R, Willemer C, Krüger K, Duning T, Warnecke T, Sommer J, et al. Physical activity and memory functions: an interventional study. *Neurobiol Aging* 2011; 32: 1304–19. <https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2009.08.001>
- Cassilhas RC, Viana VA, Grassmann V, Santos RT, Santos RF, Tufik S, et al. The impact of resistance exercise on the cognitive function of the elderly. *Med Sci Sports Exerc* 2007; 39: 1401–7. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e318060111f>
- Lachman ME, Neupert SD, Bertrand R, Jette AM. The effects of strength training on memory in older adults. *J Aging Phys Act* 2006; 14: 59–73. <https://doi.org/10.1123/japa.14.1.59>
- van de Rest O, van der Zwaluw NL, Tieland M, Adam JJ, Hiddink GJ, van Loon LJ, et al. Effect of resistance-type exercise training with or without protein supplementation on cognitive functioning in frail and pre-frail elderly: secondary analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Mech Ageing Dev* 2014; 136–137: 85–93. <https://doi.org/10.1016/j.mad.2013.12.005>
- Martin CK, Anton SD, Han H, York-Crowe E, Redman LM, Ravussin E, et al. Examination of cognitive function during six months of calorie restriction: results of a randomized controlled trial. *Rejuvenation Res* 2007; 10: 179–90. <https://doi.org/10.1089/rej.2006.0502>
- Tieland M, Borgonjen-Van den Berg KJ, van Loon LJ, de Groot LC. Dietary protein intake in community-dwelling, frail, and institutionalized elderly people: scope for improvement. *Eur J Nutr* 2012; 51: 173–9. <https://doi.org/10.1007/s00394-011-0203-6>
- Tieland M, Dirks ML, van der Zwaluw N, Verdijk LB, van de Rest O, de Groot LC, et al. Protein supplementation increases muscle mass gain during prolonged resistance-type exercise training in frail elderly people: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *J Am Med Dir Assoc* 2012; 13: 713–9. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2012.05.020>
- Hars M, Herrmann FR, Gold G, Rizzoli R, Trombetti A. Effect of music-based multitask training on cognition and mood in older adults. *Age Ageing* 2014; 43: 196–200. <https://doi.org/10.1093/ageing/aft163>
- Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A, Levälahti E, Ahtiluoto S, Antikainen R, et al. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk el-

- derly people (FINGER): a randomised control trial. *Lancet* 2015; 385: 2255–63. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60461-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60461-5)
24. Fink HA, Jutkowitz E, McCarten JR, Hemmy LS, Butler M, Davila H, et al. Pharmacologic interventions to prevent cognitive decline, mild cognitive impairment, and clinical Alzheimer-type dementia. A systematic review. *Ann Intern Med* 2018; 168(1): 39–53. <https://doi.org/10.7326/M17-1529>
25. Petersen RC, Thomas RG, Grundman M, Bennett D, Doody R, Ferris S, et al. Alzheimer's Disease Cooperative Study Group. Vitamin E and donepezil for the treatment of mild cognitive impairment. *N Engl J Med* 2005; 352(23): 2379–88. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa050151>
26. Jack CJ, Petersen R, Grundman M, Jin S, Gamst A, Ward C, et al. Longitudinal MRI findings from the vitamin E and donepezil treatment study for MCI. *Neurobiol Aging* 2008; 29(9): 1285–95. <https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2007.03.004>
27. Williamson JD, Launer LJ, Bryan RN, Coker LH, Lazar RM, Gerstein HC, et al; Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Memory in Diabetes Investigators. Cognitive function and brain structure in persons with type 2 diabetes mellitus after intensive lowering of blood pressure and lipid levels: a randomized clinical trial. *JAMA Intern Med* 2014; 174: 324–33. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.13656>
28. Sequist E, Miller M, Fonseca V, Ismail-Beigi F, Launer L, Punthakee Z. Effect of thiazolidinediones and insulin on cognitive outcomes in ACCORD-MIND. *J Diabetes Complications* 2013; 27: 485–91. <https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2013.03.005>
29. Launer LJ, Miller ME, Williamson JD, Lazar RM, Gerstein HC, Murray AM, et al; ACCORD MIND investigators. Effects of intensive glucose lowering on brain structure and function in people with type 2 diabetes (ACCORD MIND): a randomised open-label substudy. *Lancet Neurol* 2011; 10: 969–77. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(11\)70188-0](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(11)70188-0)
30. Cukierman-Yaffe T, Bosch J, Diaz R, Dyal L, Hancu N, Hildebrandt P, et al; ORIGIN Investigators. Effects of basal insulin glargine and omega-3 fatty acid on cognitive decline and probable cognitive impairment in people with dysglycaemia: a substudy of the ORIGIN trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2014; 2: 562–72. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(14\)70062-2](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(14)70062-2)
31. Hildreth KL, Van Pelt RE, Moreau KL, Grigsby J, Hoth KF, Pelak V, et al. Effects of pioglitazone or exercise in older adults with mild cognitive impairment and insulin resistance: a pilot study. *Dement Geriatr Cogn Dis Extra* 2015; 5: 51–63. <https://doi.org/10.1159/000371509>
32. Luchsinger JA, Perez T, Chang H, Mehta P, Steffener J, Pradabhan G, et al. Metformin in amnestic mild cognitive impairment: results of a pilot randomized placebo controlled clinical trial. *J Alzheimers Dis* 2016; 51: 501–14. <https://doi.org/10.3233/JAD-150493>
33. Breitner JC, Martin BK, Meinert CL. The suspension of treatments in ADAPT: concerns beyond the cardiovascular safety of celecoxib or naproxen. *PLOS Clin Trials* 2006; 1: e41. <https://doi.org/10.1371/journal.pctr.0010041>
34. ADAPT Research Group. Cardiovascular and cerebrovascular events in the randomized, controlled Alzheimer's Disease Anti-Inflammatory Prevention Trial (ADAPT). *PLOS Clin Trials* 2006; 1: e33. <https://doi.org/10.1371/journal.pctr.0010033>
35. Kang JH, Cook N, Manson J, Buring JE, Grodstein F. Low dose aspirin and cognitive function in the women's health study cognitive cohort. *BMJ* 2007; 334: 987. <https://doi.org/10.1136/bmjj.39166.597836.BE>
36. Yaffe K, Krueger K, Cummings SR, Blackwell T, Henderson VW, Sarkar S, et al. Effect of raloxifene on prevention of dementia and cognitive impairment in older women: the Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation (MORE) randomized trial. *Am J Psychiatry* 2005; 162: 683–90. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.4.683>
37. Yaffe K, Krueger K, Sarkar S, Grady D, Barrett-Connor E, Cox DA, et al; Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation Investigators. Cognitive function in postmenopausal women treated with raloxifene. *N Engl J Med* 2001; 344: 1207–13. <https://doi.org/10.1056/NEJM200104193441604>
38. Nickelsen T, Lufkin EG, Riggs BL, Cox DA, Crook TH. Raloxifene hydrochloride, a selective estrogen receptor modulator: safety assessment of effects on cognitive function and mood in postmenopausal women. *Psychoneuroendocrinology* 1999; 24: 115–28. [https://doi.org/10.1016/S0306-4530\(98\)00041-9](https://doi.org/10.1016/S0306-4530(98)00041-9)
39. Resnick SM, Matsumoto AM, Stephens-Shields AJ, Ellenberg SS, Gill TM, Shumaker SA, et al. Testosterone treatment and cognitive function in older men with low testosterone and age-associated memory impairment. *JAMA* 2017; 317: 717–27. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.21044>
40. Qato DM, Wilder J, Schumm LP, Gillet V, Alexander GC. Changes in prescription and over-the-counter medication and dietary supplement use among older adults in the United States, 2005 vs 2011. *JAMA Intern Med* 2016; 176: 473–82. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.8581>
41. Butler M, Nelson VA, Davila H, Ratner E, Fink HA, Hemmy LS, et al. Over-the-counter supplement interventions to prevent cognitive decline, mild cognitive impairment, and clinical Alzheimer-type dementia. A systematic review. *Ann Intern Med* 2018; 168(1): 52–63. <https://doi.org/10.7326/M17-1530>
42. Yurko-Mauro K, McCarthy D, Rom D, Nelson EB, Ryan AS, Blackwell A, et al; MIDAS Investigators. Beneficial effects of docosahexaenoic acid on cognition in age-related cognitive decline. *Alzheimers Dement* 2010; 6: 456–64. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2010.01.013>
43. Witte AV, Kerti L, Hermannstädtler HM, Fiebach JB, Schreiber SJ, Schuchardt JP, et al. Long-chain omega-3 fatty acids improve brain function and structure in older adults. *Cereb Cortex* 2014; 24: 3059–68. <https://doi.org/10.1093/cercor/bht163>
44. Lee LK, Shahar S, Chin AV, Yusoff NA. Docosahexaenoic acid-concentrated fish oil supplementation in subjects with mild cognitive impairment (MCI): a 12-month randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Psychopharmacology (Berl)* 2013; 225: 605–12. <https://doi.org/10.1007/s00213-012-2848-0>
45. Gleason CE, Carlsson CM, Barnet JH, Meade SA, Setchell KD, Atwood CS, et al. A preliminary study of the safety, feasibility and cognitive efficacy of soy isoflavone supplements in older men and women. *Age Ageing* 2009; 38: 86–93. <https://doi.org/10.1093/ageing/afn227>
46. Ho SC, Chan AS, Ho YP, So EK, Sham A, Zee B, et al. Effects of soy isoflavone supplementation on cognitive function in Chinese postmenopausal women: a double-blind, randomized, controlled trial. *Menopause* 2007; 14: 489–99. <https://doi.org/10.1097/GME.0b013e31802c4f4f>

47. Kato-Kataoka A, Sakai M, Ebina R, Nonaka C, Asano T, Miyamori T. Soybean-derived phosphatidylserine improves memory function of the elderly Japanese subjects with memory complaints. *J Clin Biochem Nutr* 2010; 47: 246–55. <https://doi.org/10.3164/jcbn.10-62>
48. Kritz-Silverstein D, Von Mühlen D, Barrett-Connor E, Bressel MA. Isoflavones and cognitive function in older women: the SOY and Postmenopausal Health In Aging (SOPHIA) Study. *Menopause* 2003; 10: 196–202. <https://doi.org/10.1097/00042192-20031003-00004>
49. DeKosky ST, Williamson JD, Fitzpatrick AL, Kronmal RA, Ives DG, Saxton JA, et al; Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Study Investigators. Ginkgo biloba for prevention of dementia: a randomized controlled trial. *JAMA* 2008; 300: 2253–62. <https://doi.org/10.1001/jama.2008.683>
50. Dodge HH, Zitzelberger T, Oken BS, Howieson D, Kaye J. A randomized placebo-controlled trial of Ginkgo biloba for the prevention of cognitive decline. *Neurology* 2008; 70: 1809–17. <https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000303814.13509.db>
51. Snitz BE, O'Meara ES, Carlson MC, Arnold AM, Ives DG, Rapp SR, et al; Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Study Investigators. Ginkgo biloba for preventing cognitive decline in older adults: a randomized trial. *JAMA* 2009; 302: 2663–70. <https://doi.org/10.1001/jama.2009.1913>
52. Vellas B, Coley N, Ousset PJ, Berrut G, Dartigues JF, Dubois B, et al; GuidAge Study Group. Long-term use of standardised Ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer's disease (GuidAge): a randomised placebo-controlled trial. *Lancet Neurol* 2012; 11: 851–9. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(12\)70206-5](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(12)70206-5)
53. Gavrilova SI, Preuss UW, Wong JW, Hoerr R, Kaschel R, Bachinskaya N; GIMCIPplus Study Group. Efficacy and safety of Ginkgo biloba extract EGb 761 in mild cognitive impairment with neuropsychiatric symptoms: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multi-center trial. *Int J Geriatr Psychiatry* 2014; 29: 1087–95. <https://doi.org/10.1002/gps.4103>
54. Durga J, van Boxtel MP, Schouten EG, Kok FJ, Jolles J, Katan MB, et al. Effect of 3-year folic acid supplementation on cognitive function in older adults in the FACIT trial: a randomised, double blind, controlled trial. *Lancet* 2007; 369: 208–16. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60109-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60109-3)
55. Walker JG, Batterham PJ, Mackinnon AJ, Jorm AF, Hickie I, Fenech M, et al. Oral folic acid and vitamin B-12 supplementation to prevent cognitive decline in community-dwelling older adults with depressive symptoms – the Beyond Ageing Project: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr* 2012; 95: 194–203. <https://doi.org/10.3945/ajcn.110.007799>
56. van der Zwaluw NL, Dhonukshe-Rutten RA, van Wijngaarden JP, Brouwer-Brolsma EM, van de Rest O, In 't Veld PH, et al. Results of 2-year vitamin B treatment on cognitive performance: secondary data from an RCT. *Neurology* 2014; 83: 2158–66. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000001050>
57. Andreeva V, Kesse-Guyot E, Barberger-Gateau P, Fezeu L, Hercberg S, Galan P. Cognitive function after supplementation with B vitamins and long-chain omega-3 fatty acids: ancillary findings from the SU.FOL.OM3 randomized trial. *Am J Clin Nutr* 2011; 94: 278–86. <https://doi.org/10.3945/ajcn.110.006320>
58. McMahon JA, Green TJ, Skeaff CM, Knight RG, Mann JJ, Williams SM. A controlled trial of homocysteine lowering and cognitive performance. *N Engl J Med* 2006; 354: 2764–72. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa054025>
59. Smith AD, Smith SM, de Jager CA, Whitbread P, Johnston C, Agacinski G, et al. Homocysteine-lowering by B vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. *PLoS One* 2010; 5: e12244. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0012244>
60. de Jager CA, Ouhaj A, Jacoby R, Refsum H, Smith AD. Cognitive and clinical outcomes of homocysteine-lowering B-vitamin treatment in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. *Int J Geriatr Psychiatry* 2012; 27: 592–600. <https://doi.org/10.1002/gps.2758>
61. Douaud G, Refsum H, de Jager CA, Jacoby R, Nichols TE, Smith SM, et al. Preventing Alzheimer's disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2013; 110: 9523–8. <https://doi.org/10.1073/pnas.1301816110>
62. Ouhaj A, Jernerén F, Refsum H, Smith AD, de Jager CA. Omega-3 fatty acid status enhances the prevention of cognitive decline by B vitamins in mild cognitive impairment. *J Alzheimers Dis* 2016; 50: 547–57. <https://doi.org/10.3233/JAD-150777>
63. Rossom RC, Espeland MA, Manson JE, Dysken MW, Johnson KC, Lane DS, et al. Calcium and vitamin D supplementation and cognitive impairment in the Women's Health Initiative. *J Am Geriatr Soc* 2012; 60: 2197–205. <https://doi.org/10.1111/jgs.12032>
64. Kryscio RJ, Abner EL, Caban-Holt A, Lovell M, Goodman P, Darke AK, et al. Association of antioxidant supplement use and dementia in the Prevention of Alzheimer's Disease by Vitamin E and Selenium Trial (PREADViSE). *JAMA Neurol* 2017; 74: 567–73. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2016.5778>
65. Kang JH, Cook NR, Manson JE, Buring JE, Albert CM, Grodstein F. Vitamin E, vitamin C, beta carotene, and cognitive function among women with or at risk of cardiovascular disease: the Women's Antioxidant and Cardiovascular Study. *Circulation* 2009; 119: 2772–80. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.108.816900>
66. Kang JH, Cook N, Manson J, Buring JE, Grodstein F. A randomized trial of vitamin E supplementation and cognitive function in women. *Arch Intern Med* 2006; 166: 2462–8. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.22.2462>
67. Wolters M, Hickstein M, Flintermann A, Tewes U, Hahn A. Cognitive performance in relation to vitamin status in healthy elderly German women – the effect of 6-month multivitamin supplementation. *Prev Med* 2005; 41: 253–9. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2004.11.007>
68. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of antioxidant vitamin supplementation in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. *Lancet* 2002; 360: 23–33. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)09328-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)09328-5)
69. Grodstein F, O'Brien J, Kang JH, Dushkes R, Cook NR, Okereke O, et al. Long-term multivitamin supplementation and cognitive function in men: a randomized trial. *Ann Intern Med* 2013; 159: 806–14. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-159-12-201312170-00006>
70. McNeill G, Avenell A, Campbell MK, Cook JA, Hannaford PC, Kilonzo MM, et al. Effect of multivitamin and multimineral supplementation on cognitive function in men and women aged 65 years and over: a randomised controlled trial. *Nutr J* 2007; 6: 10. <https://doi.org/10.1186/1475-2891-6-10>

71. Naeini AM, Elmadafa I, Djazayery A, Barekatain M, Ghazvini MR, Djalali M, et al. The effect of antioxidant vitamins E and C on cognitive performance of the elderly with mild cognitive impairment in Isfahan, Iran: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *Eur J Nutr* 2014; 53: 1255–62. <https://doi.org/10.1007/s00394-013-0628-1>
72. Butler M, McCready E, Nelson VA, Desai P, Ratner E, Fink HA, et al. Does cognitive training prevent cognitive decline? A systematic review. *Ann Intern Med* 2018; 168(1): 63–9. <https://doi.org/10.7326/M17-1531>
73. Wolinsky FD, Vander Weg MW, Howren MB, Jones MP, Dotson MM. A randomized controlled trial of cognitive training using a visual speed of processing intervention in middle aged and older adults. *PLoS One* 2013; 8: e61624. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0061624>
74. Klusmann V, Evers A, Schwarzer R, Schlattmann P, Reischies FM, Heuser I, et al. Complex mental and physical activity in older women and cognitive performance: a 6-month randomized controlled trial. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2010; 65: 680–8. <https://doi.org/10.1093/gerona/glp053>
75. Miller KJ, Dye RV, Kim J, Jennings JL, O'Toole E, Wong J, et al. Effect of a computerized brain exercise program on cognitive performance in older adults. *Am J Geriatr Psychiatry* 2013; 21: 655–63. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2013.01.077>
76. Ball K, Berch DB, Helmers KF, Jobe JB, Leveck MD, Marsiske M, et al; Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly Study Group. Effects of cognitive training interventions with older adults: a randomized controlled trial. *JAMA* 2002; 288: 2271–81. <https://doi.org/10.1001/jama.288.18.2271>
77. Carretti B, Borella E, Zavagnin M, de Beni R. Gains in language comprehension relating to working memory training in healthy older adults. *Int J Geriatr Psychiatry* 2013; 28: 539–46. <https://doi.org/10.1002/gps.3859>
78. Stine-Morrow EA, Payne BR, Roberts BW, Kramer AF, Morrow DG, Payne L, et al. Training versus engagement as paths to cognitive enrichment with aging. *Psychol Aging* 2014; 29: 891–906. <https://doi.org/10.1037/a0038244>
79. Kwok TC, Bai X, Li JC, Ho FK, Lee TM. Effectiveness of cognitive training in Chinese older people with subjective cognitive complaints: a randomized placebo-controlled trial. *Int J Geriatr Psychiatry* 2013; 28: 208–15. <https://doi.org/10.1002/gps.3812>
80. Vidovich MR, Lautenschlager NT, Flicker L, Clare L, McCaul K, Almeida OP. The PACE study: a randomized clinical trial of cognitive activity strategy training for older people with mild cognitive impairment. *Am J Geriatr Psychiatry* 2015; 23: 360–72. <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2014.04.002>
81. Herrera C, Chambon C, Michel BF, Paban V, Alescio-Lautier B. Positive effects of computer-based cognitive training in adults with mild cognitive impairment. *Neuropsychologia* 2012; 50: 1871–81. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.04.012>
82. Rapp S, Brenes G, Marsh AP. Memory enhancement training for older adults with mild cognitive impairment: a preliminary study. *Aging Ment Health* 2002; 6: 5–11. <https://doi.org/10.1080/13607860120101077>
83. Larson EB. Prevention of late-life dementia: no magic bullet. *Ann Intern Med* 2018; 168(1): 77–9. <https://doi.org/10.7326/M17-3026>

G. Navickaitė

THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY, PHARMACOLOGIC INTERVENTIONS, OVER-THE-COUNTER SUPPLEMENTS AND COGNITIVE TRAINING IN PREVENTING ALZHEIMER'S DISEASE, MILD COGNITIVE IMPAIRMENT AND RELATED DEMENTIAS: AN OVERVIEW

Summary

Due to the aging population, the incidence of Alzheimer's disease and related dementias (ADRD) and mild cognitive impairment (MCI) is likely to increase. Currently, there is no hard evidence neither on effective methods of their treatment nor on even prevention. However, the potential benefits of physical activity, pharmacologic interventions, over-the-counter supplements and cognitive training are publicly discussed. Nonetheless, positive effects of such methods are not based on the evidence obtained from the related studies. This article presents an overview of the results of systematic analyses of the four methods – physical activity, pharmacologic interventions, over-the-counter supplements and cognitive training – and their effect in preventing ADRD and MCI.

Keywords: Alzheimer's disease, dementia, mild cognitive impairment, physical activity, pharmacologic intervention, over-the-counter supplements, cognitive training.

Gauta:
2018 02 16

Priimta spaudai:
2018 02 27